



FICHA TECNICA

RATIDEL PARAFINADO

USO URBANO

Identificación del fabricante/distribuidor:

AGROformuladora Delta, S.A.de C.V.
Av. Chapultepec 1218, pte.
Col. Buenos Aires, C.P. 64800
Monterrey, N.L.
Tel. +53 (81)358-1247, 49 y 53
www.agrodelta.com.mx

ENCASO DE INTOXICACION COMUNICARSE A:

Servicio de información toxicológica (ATOX) las 24 hrs. 365 días del año
Cd. De México y zona metropolitana **(55) 5598-6659, (55) 5611-2634.**
Interior de la república, **LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869**

GARANTIA DE COMPOSICION

COMPOSICION		PORCENTAJE EN PESO
Bromadiolona.....	NO MENOS DE	0.005 %
(equivalente a 0.05 g. /Kg.)		
Otros ingredientes		
(vehículo, atrayentes, colorantes, entre otros).....	NO MAS DE	99.995 %

REG. COFEPRIS: **RSCO-URB-RODE-511-349-057-0.005**

RATIDEL PARAFINADO es un anticoagulante de segunda generación, controla los roedores con la primera dosis que ingieren.

Al ser ingerido, provoca la inhibición de la formación de protrombina, bloqueando el mecanismo de coagulación de la sangre, lo que significa que el animal muere por hemorragias internas, a los 4 ó 5 días después de comerlo.

El efecto retardado impide que se presente recelo al cebo.

RATIDEL PARAFINADO, es un raticida listo para usarse, actúa contra rata de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), rata de los tejados (*Rattus rattus*), ratón domestico (*Mus musculus*). Su uso es general en aplicaciones domesticas, bodegas, industria, instalaciones pecuarias y otros.
Tiene una mayor durabilidad en ambientes húmedos.

Aplique **RATIDEL PARAFINADO**, tan pronto se observen las primeras señales de los roedores (*fecas, huellas, roeduras, manchas, pelo*).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Manténgase fuera del alcance de los niños, y animales domésticos, lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos

CATEGORIA 4 NOCIVO EN CASO DE INGESTION PRECAUCION

INSTRUCCIONES DE USO

PLAGA	DOSIS	FRECUENCIA E INTERVALOS ENTRE CADA APLICACION	TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS
RATON DOMESTICO (Mus musculus)	De 30 a 50 g.	Revise los cebaderos cada 7 días y reponga el alimento que hayan consumido. Sustituya los cebaderos que se encuentren descompuestos o con hongos Si existe una alta infestación, coloque permanentemente las estaciones de cebado, manteniendo un abasto ininterrumpido de RatiDel-B cubos.	De inmediato.
RATA DE ALCANTARILLAS O RATA PARDA (Rattus norvegicus)	De 50 a 100 g.		
RATA DE LOS TEJADOS Ó RATA NEGRA (Rattus rattus)	De 50 a 100 g.		
RATA NUTRIA COLORADA (Holochilus brasiliensis)	De 50 a 100 g.		
RATA PARDA (Sigmodon hispidus)	De 50 a 100 g.		

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS

De inmediato.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Determinar el área donde es más factible encontrar roedores y que puedan consumir el cebo. Elimine la comida accesible y aplique en cajas ó cebaderos la dosis recomendada en recuadro anterior, mantenga un abasto ininterrumpido de cebo fresco, por lo menos 10 a 15 días dependiendo de la especie a controlar.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA

INTOXICACION

Inapetencia, cansancio, apatía, vértigo. A los dos días se presentan hemorragias internas, hemorragia nasal y encías sangrientas.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LA PIEL: Lávese con agua y jabón por 15 minutos.

INGESTION: Provocar el vomito dando de beber un vaso con agua mas una cucharada de de sal de cocina disuelta en agua tibia. Repetir el tratamiento hasta que el vomito sea claro. Mantener a la persona quieta, recostada en un lugar fresco

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Producto anticoagulante de la familia cumarina. Inhibe el metabolismo de la vitamina K y causa disminución de los factores de coagulación dependiente. Provoca la reducción de la tasa de protrombina.