

**FICHA TECNICA  
USO DOMESTICO**

**Siege® Pro**  
Hidrametilona

**“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**

<b>Ingrediente activo</b> Hidrametilona (Equivalente a 7.3 gr/Kg)	No menos de:	<b>% EN PESO</b> 0.73%
<b>Ingredientes inertes</b>	No más de:	99.27 %
	Total	100.00%

**REG. RSCO-DOM-INAC-181-308-005-0.730**

**HECHO EN E.U.A.**

**REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:**

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.  
AV. INSURGENTES SUR 975,  
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,  
C.P. 03710, MÉXICO; D.F.  
TEL: 01 (55) 5325-2600

**Instrucciones de Uso**

**Siege® Pro** se usa para el control de hormiga de fuego y hormiga cabezona. Dosis según el tipo de área a tratar.

<b>TRATAMIENTO</b>	<b>DOSIS</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>
Individual por hormiguero Hormiga de fuego Hormiga trozadora Hormiga cabezona	5 cucharaditas (20-25 g)	Distribuir el cebo uniformemente alrededor de la base del hormiguero, no aplicar directamente en la cima del mismo. No aplicar más de 1.5 Kg. de cebo por hectárea.
Hormiga de fuego Hormiga trozadora Total	1.1 – 1.6 Kg/ha	Esparcir el cebo uniformemente con equipo mecánico (de discos) o aéreo.
Hormiga cabezona Total	1.1 – 2.2 Kg/ha	Esparcir el cebo uniformemente con equipo mecánico (de discos) o aéreo.

**Método de aplicación.**

Aplicar cuando las hormigas estén en actividad (generalmente cuando la temperatura del suelo es mayor a 15 C.). Cuando se espera lluvia o el suelo tiene mucha humedad, no aplique **Siege® Pro**. Aplique de preferencia por la mañana o por la tarde.



The Chemical Company

**Siege® Pro** es un cebo altamente atractivo para hormigas de fuego y cabezonas. Este trabaja siendo parte de la cadena alimenticia de las hormigas. Las hormigas encontrarán el cebo **Siege® Pro** y lo llevarán al hormiguero para alimentar a la reina y a las demás. No se debe molestar al hormiguero durante la aplicación. Un insecticida para hormigas eficiente, debe actuar despacio para que pueda ser llevado por las hormigas a través del hormiguero hasta la reina.

**Siege® Pro** es un insecticida de acción lenta y en especial efectivo contra la reina. Generalmente en 1 a 4 semanas la reina y un gran número de hormigas morirán. Dentro de 2 a 8 semanas se observará una reducción en la actividad del hormiguero. Los hormigueros muy grandes pueden continuar su actividad por cierto tiempo aún cuando la reina haya muerto y no habrá más reproducción.