

# QF 20-20-20

**Uso:** Fertilizante foliar para todas las fases de crecimiento.

**PROPIEDADES:** Fertilizante Foliar QF 20-20-20 es un fertilizante completo para la nutrición de todo tipo de cultivos de alto rendimiento. Su formulación con una relación 1:1:1 de N-P-K lo hace un fertilizante muy versátil, para ser aplicado en cualquier etapa fenológica del cultivo, ya sea como auxiliar o para corregir alguna deficiencia de nutrientes.

El fertilizante foliar QF 20-20-20, combina un adecuado balance de macronutrientes y micronutrientes quelatados, fitohormonas y reforzado con ácidos fúlvicos, es 100 % soluble, libre de impurezas que causen taponamiento en boquillas.



## COMPOSICIÓN:

<b>Nitrógeno</b>	<b>20.0 %</b>
<b>Fósforo (P2O5)</b>	<b>20.0 %</b>
<b>Potasio (K2O)</b>	<b>20.0 %</b>
<b>Calcio (Ca)</b>	<b>0.0065 %</b>
<b>Magnesio (Mg)</b>	<b>0.0065 %</b>
<b>Azufre (S)</b>	<b>0.048 %</b>
<b>Micro elementos: Fe, Zn, Mn, Cu, B, Co, Mo.</b>	
<b>Fitohormonas</b>	<b>0.003 %</b>
<b>Ácidos fúlvicos</b>	<b>1.0%</b>

## METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, posteriormente agregue QF 20-20-20 removiendo lenta y uniformemente. Puede agregar otros productos fitosanitarios. Llene el tanque completamente y aplique la mezcla con el sistema de agitación en movimiento. Asperje homogéneamente para lograr una cobertura completa y uniforme del follaje.

## RECOMENDACIONES DE USO.

CULTIVO	DOSIS kg/ha	EPOCA DE APLICACIÓN
Tomate, chile, berenjena	2	3 a 5 aplicaciones después de 30 días de la emergencia y dependiendo del ciclo del cultivo.
Papa		2 a 3 aplicaciones durante el primer tercio del ciclo del cultivo.
Leguminosas: Frijol, frijol ejotero, chícharo, soya	2	2 a 3 Aplicaciones. 15 días después de la emergencia hasta antes de la floración.
Alfalfa	3	A los 10-15 días después de cada corte.
Cucurbitáceas: Melón, pepino, calabaza, sandía	2	3 a 4 aplicaciones iniciando a los 30 días después de la emergencia y a intervalos de 10 a 15 días.
Gramíneas: Maíz, trigo, cebada, sorgo	2	3 aplicaciones cada 15 días desde el amacollamiento hasta antes del espigamiento.
Frutales	2	Después de la cosecha, aplique hasta 30 días antes de la floración con intervalo de 15 días.

**PRESENTACIÓN:** Caja con 15 bolsas de 1 kilos c/u.

FORMULADO EN MÉXICO POR:



**Química Foliar s.a. de c.v.**

Av. Urbina No. 4, Fraccionamiento Parque Industrial  
Naucalpan, Edo. De México C. P. 53489  
Tel. 53-00-35-71 Fax 53-01-08-63  
[ventas@qfoliar.com.mx](mailto:ventas@qfoliar.com.mx) [www.qfoliar.com.mx](http://www.qfoliar.com.mx)