

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.
 Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, pantalón largo, camisa de manga larga, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, googles o lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. Después de una jornada de trabajo: lave los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Lave la ropa y equipo de protección con agua caliente y detergente separado de otra ropa, deseche las ropas y otros materiales adsorbentes que se hayan empapado o contaminado seriamente con el concentrado de este producto. No las vuelva a usar. Todos los usuarios deberán lavarse las manos antes de comer, fumar, beber, mascar chicle, tabaco o usar el baño. Lavarse perfectamente y ponerse ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO.
 "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO" "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS; ROPA O FORRAJES" "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS"
 "LAVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACION"
 "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
 "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
 "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
 "NO SE INGERIR, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
 "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES; USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
GRUPO QUÍMICO: ORGANOFOSFORADOS.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.- Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica. Agudos: Contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, calambres y sensación de asfixia.
TRATAMIENTO Y ANTIDOTO: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg. cada uno de Atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 4 mg. de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completa atropinización.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"
 "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"
 "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE LOS POZOS DE AGUA Y NO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"
 "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMÁS RECÓGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAANO"
GARANTÍA
 United Phosphorus de México, S.A. de C.V., garantiza el contenido exacto de los componentes indicando en la composición porcentual de esta etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

"USO AGRÍCOLA"



terbufos

insecticida / granulado
 "COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:

TERBUFOS : S-[[1,1- Dimetil etil] tio]metil] 0,0-dietil fosforoditioato..... 5.00%
 (Equivalente a 50 g. de i.a./Kg.)

INGREDIENTES INERTES:

Diluyente granulado (Portador) y acondicionador:..... 95.00%
 100.00%

Registro: RSCO-INAC-0163-326-005-005

Contenido neto: 5 Kg

PELIGRO



MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN
MORTAL POR EL CONTACTO CON LA PIEL

MORTAL SI SE INHALA

Lote: Fecha de fabricación:
TITULAR DEL REGISTRO: UPM Fecha de Caducidad: 2 años después de su fabricación

DISTRIBUIDO POR:
 Agroquímica Tridente S.A. de C.V.
 Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
 Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
 Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx
 "HECHO EN MÉXICO"

"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADO"
 "INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

COSTER 5G es un insecticida formulado como granulado, basado en Terbufos, con acción sistémica y de contacto, recomendado para el combate y control de plaga que a continuación se indica:

Cultivo Nombre común Nombre científico	Plaga	Dosis Kg/ha
Sorgo (60)		

() **INTERVALO DE SEGURIDAD:** DIAS QUE DEBEN TRANSCURRIR ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA

QUEDA DETERMINADO DE POR SI POR EL USO TEMPORAL NO DEL PRODUCTO.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas después de haber aplicado el producto.

MÉTODOS DE PREPARACION Y APLICACION DEL PRODUCTO:

COSTER 5G esta formulado como granulado, por lo que para aplicarse se recomienda un aplicador tipo Gandy. Llene los depósitos de su equipo de aplicación Gandy, con la ropa de protección recomendada.

CONTRAINDICACIONES: No haga aplicaciones cuando el viento sea fuerte (más de 15 Km./hora), vierta los granulos en la misma dirección del viento y nunca haga la aplicación al nivel de la cara.

INCOMPATIBILIDAD: No es compatible con materiales de reacción alcalina. La mezcla con otros productos, será con aquellos que cuente con registro vigente y que están autorizados para los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETA LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL."



PELIGRO