



FICHA TÉCNICA METILICO 3

NOMBRE COMERCIAL: METILICO 3

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Organofosforado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Paratión metílico: 0,0-Dimetil 0-(4-nitrofenil fosforotioato **3.00 %**

(Equivalente a 30 g de I.A./Kg)

Diluyentes y compuestos relacionados, no más de **97.00 %**

REG: RSCO-INAC-0155-042-001-003

TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida y/o acaricida/Polvo

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Polvo sólido; Densidad relativa 0.944 g/mL.

MODO DE ACCIÓN: Principalmente es afectar el sistema nervioso central, desde la unión neuromuscular no colinérgica como en mamíferos. La única sinapsis colinérgica conocida en insectos es en el sistema nervioso central. La unión neuromuscular química transmitida en insectos es ácido glutámico

USOS AUTORIZADOS: Para su aplicación al follaje en los cultivos de algodónero, berenjena, brócoli, cacahuate, chícharo, col, col de Bruselas, coliflor, frijol, jitomate, lechuga, maíz, melón, ornamentales, papa, sandía, soya y tabaco.

ENFERMEDADES, DOSIS Y OBSERVACIONES:

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO)	DOSIS KG/HA
Berenjena (15)	Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>); Pulga saltona (<i>Epitrix spp</i>)	15 – 20
Maíz (12)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>); Chapulines (<i>Sphenarium spp</i> , <i>Melanoplus spp</i>); Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>)	
Frijol (15)	Conchuela (<i>Epilachna varivestis</i>); Picudo (<i>Apion godmani</i>); Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>); Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>); Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>); Trips (<i>Frankiniella spp</i>); Pulgón (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)	15 – 20
Soya (15)		
Cacahuete (21)		
Chícharo (10)		
Melón (15)	Diabrotica (<i>Diabrotica spp</i>); Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>); Barrenador del pepino (<i>Diaphania nitidalis</i>); Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>); Pulga saltona negra (<i>Epitrix spp</i>)	15 – 20
Sandía (15)		
Col (21)	Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>); Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>); Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>); Mariposa blanca de la col (<i>Artogeia rapae</i>); Pulgón (<i>Aphis spp</i>)	10 – 15
Coliflor (21)		
Brócoli (21)		
Col de Bruselas (21)		
Lechuga (21)	Pulgón verde (<i>Myzus spp</i>)	
Jitomate (10)	Pulgón (<i>Aphis spp</i>); Pulga saltona (<i>Epitrix spp</i>); Chicharrita (<i>Eutettix spp</i>); Gusano alfiler (<i>Keiferia lycopersicella</i>); Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>)	10 – 15
Papa (5)	Pulgón (<i>Macrosiphum spp</i>); Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>); Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>)	
Ornamentales (Sin límite)	Pulgón (<i>Aphis spp</i> , <i>Macrosiphum spp</i>); Trips (<i>Thrips spp</i>); Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	10 – 15

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior de la bolsa ó saco, realizar está operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

1. Se aplica directamente sobre el cultivo.

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA METILICO 3



2. Añada la cantidad necesaria en el contenedor del aplicador (mecánico o manual) o por avión.
3. Aplique el insecticida de acuerdo a la tabla de dosis indicadas anteriormente, se recomienda aplicar de 5 a 7 días hasta el control de la infestación.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando haya vientos fuertes. No entrar a los campos hasta tres días después del tratamiento.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.

