



FICHA TÉCNICA POTRERO 101

NOMBRE COMERCIAL: POTRERO 101

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: : **Picloram + 2,4-D** es derivado del ácido picolínico (Picloram) y de los fenoxi (2,4-D).

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Picloram: Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropiridin-2-carboxílico, **5.49%**

(Equivalente a 64 g de i.a./L a 20°C)

2,4-D: Ácido (2,4-diclorofenoxi) acético, **20.58%**

(Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C)

Agente neutralizante y Disolvente, **73.93%**

REG: RSCO-MEZC-1219-0669-375-26.07

TIPO DE FORMULACIÓN: Herbicida/ Concentrado Soluble

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Líquido; soluble en agua, ligero olor a alcohol.

MODO DE ACCIÓN: Asociación 2,4-D se trasloca y acumulan en las zonas meristémicas de brotes y raíces, principalmente. Actúa como inhibidor del crecimiento. Estimula la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas, afectando la actividad de las enzimas, la respiración y la división celular, picloram: derivado del ácido piridincarboxílico, sistémico, selectivo, regulador del crecimiento que es absorbido por las hojas y raíces.

USOS AUTORIZADOS: **Potrero 101** aplicación foliar en el cultivo de pastizal establecido en Potreros.

FICHA TÉCNICA POTRERO 101



Potrero 101 es recomendado en el cultivo y contra las malezas, aquí indicados:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Pastizales establecidos en potreros (30)	DORMILONA (<i>Mimosa pudica</i>) ESCOBILLA (<i>Sida acuta</i>) MALA MUJER (<i>Onidoscolus urens</i>) MALVA (<i>Malva parviflora</i>) ACEITILLA (<i>Bidens odorata</i>)	2.0-4.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, volumen de aplicación 330 – 430 L de agua/ha

() **INTERVALO DE SEGURIDAD:** días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la entrada del ganado.

TIEMPO DE REENTRADA: 12 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra el envase de **POTRERO 101** utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES: **POTRERO 101** deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD: **POTRERO 101** no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: **POTRERO 101** no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para su aplicación.

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: <http://www.tridente.com.mx>