"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía
- Bañarse cuidadosamente y colocarse ropa limpia

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, y si está consciente la persona, sentar y provocarle vómito
- Si está inconsciente (generalmente por inhalación o por ingestión), sacar a la víctima del área contaminada, desabrochar cuello y cinturón, llamar al médico señalando la naturaleza del producto.
- Mantener abrigado al sujeto con una manta, si no respira, mantener la oxigenación por medio de respiración boca a boca y si no se sienten pulsos iniciar R.C.P.
- Si hay contacto en los ojos, inmediatamente colocar al sujeto en la ducha más cercana para retirar todos los excesos del rostro, lavar continuamente con agua limpia por 15 minutos
- Por contacto a través de la piel, recurrir a duchar inmediatamente

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico de **TITANIC**. Aromático policlorado
- Síntomas y efectos: Puede provocar reacciones alérgicas temporales, irritación y enrojecimiento de las partes expuestas de la piel e irritación de los ojos.
- Tratamiento: El tratamiento es sintomático, si existen reacciones alérgicas temporales, las personas afectadas reaccionan con un tratamiento antihistamínico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

"USO AGRÍCOLA"

TITANIC 75 PH

clorotalonil

fungicida / polvo humectable

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:	%(p/p)
Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo (Equivalente a 750 g de I.A. /Kg)	75.00
Diluyente, humectante dispersante y compuestos relacionados, no más de	25.00

Registro: RSCO-FUNG-0309-398-002-075

PRECAUCIÓN

NOCIVO SI SE INHALA

Contenido: 12 x 1 kg

Lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Agroquímica Tridente S.A. de C.V.

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: 9183-2406, 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,

E-mail: tridente@prodigy.net.mx

http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGAS: NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO)	DOSIS Kg/ha	RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN
Ajo (7)	Mancha foliar (*Cercospora apii*); Mancha foliar o Tizón (*Septoria apii*); Moho blanco (*Sclerotinia sclerotiorum*)	1.2 – 1.7 2.3 – 3.4 3.4	La dosis baja en un programa de aspersión de cada 2 a 5 días. Comenzar las aplicaciones después del trasplante. No aplicar 7 días antes de cosechar
Cacahuate (14)	Tizón temprano (*Cercospora apii*); Tizón tardío (*Septoria apii*); Mancha o peca de la hoja (*Cercospora personata*); Chahuistle (*Puccinia arachidis*); Mancha angular (*Ascochyta spp*)	2.7 – 3.4	Repetir a intervalos de 10 a 14 días según las necesidades para mantener el control. No permitir que el ganado pastoree las áreas tratadas.
Calabaza (5.)	Antracnosis (*Colletotrichum lagenarium*); Cenicilla (*Erysiphe cichoracearum*); Mancha foliar (*Cercospora spp*); Mildiu (*Pseudoperonospora cubensis*); Pudrición vellosa (*Verticillium spp*); Tizón foliar (*Alternaria cucumerina*)	1.5 – 2.0	Comenzar las aplicaciones cuando las plantas tengan la primera hoja verdadera. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días
Cebolla (14)	Mancha purpura (*Alternaria porri*); Mildiu velloso (*Pseudoperonospora destructor*); Moho gris (*Botrytis alli*); Tizón de la hoja (*Botrytis squamosa*)	2.7 – 3.4	No aplicar en cebollas de bulbo seco, 7 días antes de cosechar cebollas verdes. No aplicar más de 3 veces por temporada en cebollas verdes
Ajo (14) Coliflor (7) Brócoli (7) Col de Bruselas (7)	Mancha purpura (*Alternaria porri*); Mildiu (*Peronospora destructor*); Moho gris (*Botrytis alli*); Mancha foliar (*Alternaria brassicae*); Mildiu velloso (*Peronospora parasitica*)	1.7 – 2.2	Comenzar las aplicaciones después del trasplante o inmediato a la emergencia de las plántulas después de la siembra
Durazno (14)	Mancha bacteriana (*Xanthomonas pruni*); Mancha bacteriana del tallo y hojas (*Pseudomonas syringae*); Verrugosis (*Taphrina deformans*); Tizón del fuego (*Erwinia spp*); Pudrición morena (*Monilia fructicola*); Tizón de munición (*Corynneum beijerinckii*)	350 g/100 L de agua	Aplicar durante el periodo inactivo antes de hincharse las yemas. Aplicar cuando las yemas se ponen rojizas (en plena floración), repitiendo la aplicación cada 10 a 14 días. Última aplicación antes de cosechar.
Frijol (5.) Frijol ejotero (5.)	Antracnosis (*Colletotrichum lindemuthianum*); Moho gris (*Botrytis cinerea*); Roya (*Uromyces appendiculatus*); Chahuistle (*Uromyces appendiculatus*)	1.5 – 2.5	Comenzar las aplicaciones durante el inicio de la floración. No aplicar 7 y 43 días antes de cosechar respectivamente
Melón (7) Sandía (7)	Antracnosis (*Colletotrichum lagenarium*); Cenicilla (*Erysiphe cichoracearum*); Pudrición radical (*Verticilium sp*); Roña (*Cladosporium cucumerinum*); Tizón foliar (*Alternaria cucumerina*); Mildiu velloso (*Peronospora parasitica*); Mancha foliar (*Cercospora spp*)	1.5 – 2.0 3.0	Comenzar las aplicaciones cuando las plantas tengan la primera hoja verdadera. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días
Rosal (5.)	Cenicilla (*Sphaerotheca pannosa*); Mancha negra (*Diplocarpon rosae*); Moho gris (*Botrytis rosae*)	135 g/100 L de agua	Aplicar tratar al primer síntoma de enfermedad y repetir con intervalos de 7 a 14 días
Crisantemo (5L)	Moho gris (*Botrytis cinerea*); Mancha foliar (*Myrosphaerella spp*)	170 g/100 L de agua	Aplicar a intervalos de 7 días durante periodos de tiempo húmedo o bajo enfermedad severa
Compasúchil (5L) (Mary gold)	Mancha foliar (*Alternaria spp*); Mildiu velloso (*Plasmopara sp.*)	1.5 – 2.5	Iniciar aplicaciones en cuanto aparezcan los síntomas de la enfermedad. Repetir cada 7-10 días.
Jitomate (5L) Tomate de Cáscara (5L)	Antracnosis (*Colletotrichum phomoide*); Mancha gris (*Stemphylium solani*); Moho gris (*Oladiosporium fulvum*); Tizón tardío (*Phytophthora infestans*); Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.5 – 2.5 2.5 – 3.5	Repetir la aplicación a intervalos de 7 a 10 días
Papa (5L)	Pudrición radical (*Rhizoctonia sp*); Mancha gris (*Stemphylium solani*); Pudrición radical (*Fusarium spp*); Tizón tardío (*Phytophthora infestans*); Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 – 2.0	Comenzar las aplicaciones cuando las plantas tengan 15 cm de alto o cuando la enfermedad amenace, continuar a intervalos de 7 a 10 días
Papaya (14)	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*); Pudrición del fruto (*Cercospora papayae*); Roya (*Asperopsorium caricae*)	170 – 200 g/100 L de agua	Inicie las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables a la enfermedad. Repetir las aplicaciones semanalmente hasta que los frutos estén medio desarrollados.
Pepino (7)	Antracnosis (*Colletotrichum lagenarium*); Mancha foliar (*Cercospora spp*); Mildiu (*Pseudoperonospora cubensis*); Pudrición radical (*Verticillium spp*); Roña (*Cladosporium cucumerinum*); Tizón foliar (*Alternaria cucumerina*)	1.7 – 2.2 2.2 – 3.4 3.4	Comenzar las aplicaciones cuando las plantas tengan la primera hoja verdadera. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días.
Plátano (14)	Chamico o amarillo (*Mycosphaerella musicola*); Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiei sinn. difformis*); Sigatoka amarilla (*Mycosphaerella musicola*)	1.5 – 2.0	Para aplicación aérea, usar 20 a 30 L de agua por ha, a intervalos de 10 a 21 días según la intensidad de la enfermedad y los datos históricos que incluyen periodos de alta presión. No aplicar sobre áreas que hayan sido asperjadas con aceite agrícola dentro de 7 días anteriores para evitar daños a las hojas.
Soya (42)	Antracnosis (*Colletotrichum truncatum*); Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina*); Mancha parda (*Septoria glycines*); Mancha purpura (*Cercospora kikuchii*); Mildiu (*Peronospora manchuricaí*); Tizón de la vaina y tallo (*Diaporthe phaseolorum*)	1.5 – 2.5	Hacer 2 aplicaciones, la primera de 2 a 3 semanas después de la primera floración y la segunda 10 a 14 días después, dependiendo de la severidad de las condiciones. No aplicar durante 6 semanas anteriores a la cosecha.
Zanahoria (5L)	Tizón foliar (*Alternaria dauci*); Tizón temprano (*Cercosporanonacea*)	1.7 – 2.3	Comenzar las aplicaciones cuando la enfermedad amenace

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior de la bolsa, realizar está operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO: En una cubeta con agua vierta el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme.

Agregue ésta lentamente y sin dejar de agitar al tanque de aplicación, que contenga agua hasta la mitad. Sin dejar de agitar, agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando de obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora, deberá agitar antes la mezcla.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando haya vientos fuertes, ni cuando haya calor intenso.

INCOMPATIBILIDAD: No es compatible con sustancias alcalinas. La mezcla con otros productos será con aquellos que tengan registro vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

12

159 mm