


"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía
- RECOMENDACIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
 - NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
 - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
 - MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
 - LAVÉSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
 - NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
 - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
 - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
 - NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
- CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA
- NUNCA USE EN NIÑOS
- NUNCA USE EN ANIMALES
- NUNCA USE EN PLANTAS
- NUNCA USE EN AGUAS
- NUNCA USE EN SUELOS
- NUNCA USE EN ESPERANZA
- NUNCA USE EN...

"USO AGRÍCOLA"



mancozeb

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUI RECOMENDADA
 INSTRUCIONES DE USO
 SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	NOMBRE COMUN (NOMBRE CIENTÍFICO)	PLAGAS:	DOSIS Kg/ha
Algodonero*	Viruela (<i>Puccinia carabatai</i>)		1.5 - 2.0
Apio (14)	Mancha foliar (<i>Cercospora apii</i>); Mancha foliar o tizón (<i>Sclerotinia apii</i>)		1-3
Cebolla (7)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>); Mildiu (<i>Peronospora destructor</i>)		2.0 - 3.0
Cacahuete (14)	Mancha café de la hoja (<i>Cercospora arachidicola</i>); Mancha o peca de la hoja (<i>Cercospora personata</i>)		1.5 - 2.0
Calabacita (5)	Antirracosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>); Mancha foliar (<i>Cercospora spp.</i>); Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>); Tizón foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>)		2.0 - 3.0
Melón (5)	Mancha foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>)		2.0
Espartero (26)	Mancha de hojas y tallos (<i>Septoria tritici</i>); Mancha foliar (<i>Alternaria spp.</i>); Roya del tallo (<i>Puccinia graminis</i>); Tizón o Mancha foliar (<i>Helminthosporium spp.</i>)		2.0
Avena (26)	Mancha de hojas y tallos (<i>Septoria tritici</i>); Mancha foliar (<i>Alternaria spp.</i>); Roya del tallo (<i>Puccinia graminis</i>); Tizón o Mancha foliar (<i>Helminthosporium spp.</i>)		2.0
Cebada (26)	Mancha de hojas y tallos (<i>Septoria tritici</i>); Mancha foliar (<i>Alternaria spp.</i>); Roya del tallo (<i>Puccinia graminis</i>); Tizón o Mancha foliar (<i>Helminthosporium spp.</i>)		2.0
Trigo (26)	Mancha de hojas y tallos (<i>Septoria tritici</i>); Mancha foliar (<i>Alternaria spp.</i>); Roya del tallo (<i>Puccinia graminis</i>); Tizón o Mancha foliar (<i>Helminthosporium spp.</i>)		2.0
Maíz (40)	Mancha foliar (<i>Septoria spp.</i>); Mildiu (<i>Sclerotinia spp.</i>); Peca del maíz (<i>Phyodermum zaeze-moydis</i>)		1.5
Papa** (para semilla)	Pudrición de la semilla y raíz (<i>Fusarium sp.</i> ; <i>Rhizoctonia spp.</i>)		300 g/100 L de agua ó 10 Kg/1 ton de papa
Tabaco (10)	Mancha foliar (<i>Alternaria spp.</i>); Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>); Ojo de ana (<i>Cercospora nicotianae</i>)		2.0 - 3.0
Jitomate (5)	Antirracosis (<i>Colletotrichum phomoides</i>); Mancha foliar (<i>Septoria lycopersici</i>); Mancha gris (<i>Stemphylium solani</i>); Moho gris (<i>Cladosporium fulvum</i>); Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>); Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)		1.5 - 3.0
Pimiento (30)	Antirracosis (<i>Colletotrichum spp.</i>); Chammuso amarillo (<i>Mycosphaella fructicola</i>)		200 - 400 g/100 L de agua
Manzano (30)	Antirracosis (<i>Colletotrichum spp.</i>); Fumagina (<i>Geopollium spp.</i>)		200 - 250 g/100 L
Peral (20)	Mancha foliar (<i>Cercospora spp.</i>); Pudrición anaranjada del fruto		200 - 250 g/100 L

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
 - MANTÉNGA EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFIRMADOS A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTES DE LA SEMBRANTE.
 - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
 - EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.
- #### CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
 - ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
 - ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBRANDO
- #### AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DE PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADO



NOCIVO SI SE INHALA

Contenido: 14 x 1 kg

Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.
Herberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: 9183-2406, 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,
E-mail: tridente@prodigy.net.mx
<http://www.tridente.com.mx>
"HECHO EN MÉXICO"

con mochila (manual), se requieren de 200 a 400 L de agua/ha, para aplicación por avión, se requieren de 40 a 60 L de agua/ha

3. En el caso donde se requiere ser mezclado con agua, utilizar primero una pequeña cantidad de agua para ir mezclando y después cargue la cantidad total de agua a utilizar
4. Siempre utilice su equipo de seguridad para la manipulación del producto
5. Aplique el insecticida de acuerdo a la tabla de dosis indicadas anteriormente; lea las recomendaciones que se indican en la tabla, para tener un control total de las plagas.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando haya vientos fuertes, ni cuando haya calor intenso, o probabilidad de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD: No es compatible con sustancias alcalinas. La mezcla con otros productos será con aquellos que tengan registro vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL



PRECAUCIÓN

