

(Parte central)

"APLICACIÓN URBANA"



Imidacloprid 105 g/L + Alfacipermetrina 32 g/L / RESIFUM ALFA / RESIFUM PLUS / RESIFUM MAX / RESIFUM ULTRA / RESIFUM DUO / CIRANO ALFA / CIRANO ALFA PLUS / RESIFUM ALFA FLOW / RESIFUM PLUS FLOW / RESIFUM MAX FLOW / CIRANO ALFA FLOW / CIRANO ALFA PLUS FLOW / CIRANO FLOW RESIFUM PLUS SC / RESIFUM MAX SC / RESIFUM ULTRA SC / RESIFUM DUO SC / CIRANO ALFA SC / CIRANO PLUS / CIRANO DUO / CIRANO PLUS SC / CIRANO DUO SC

Imidacloprid + Alfacipermetrina
Insecticida/Acaricida
Suspensión concentrada

"COMPOSICION PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:	%PESO
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina Equivalente a 105 g de i.a/L a 20°C	9.93%
Alfacipermetrina: Mezcla racemica (R)- α -ciano-3- fenoxibencil (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)- α -ciano-3 fenoxibencil (1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato Equivalente a 32 g de i.a/L a 20°C	3.03%
INGREDIENTES INERTES: Dispersantes, Anticongelante, Estabilizador, Antiespumante, Espesante y Diluyente.	87.04%
TOTAL	100.0%

Registro:
Contenido Neto:

**PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDA SER NOCIVO SI SE INHALA**

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después de su fabricación

**TITULAR DEL REGISTRO:
AGROQUIMICA TRIDENTE S.A DE C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas (55)9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada:
01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx www.tridente.com.mx

"HECHO EN MEXICO"

"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"

PRECAUCIÓN

Pantone Verde
(347-C)

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISION DE AUTORIZACION
SANTARIA

ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 19330061/18004
30/05/2019

GABRIELA MORENO GARCIA
SUBDIRECCION EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES

(Parte izquierda)

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO"

Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección personal adecuado como: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad con protección hermética o careta facial protectora, mascarilla con filtro, guantes y botas de neopreno. Al término de la jornada de trabajo, lave la ropa de trabajo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común. Descontamine el equipo de protección personal y el equipo de aplicación y almacénelos en el lugar de trabajo bajo llave.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS"
- "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO"
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION"
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto deberá aplicar los siguientes primeros auxilios:

Si el producto es inhalado: Retire a la persona afectada contaminada y recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, y usted se encuentra capacitado, proporcione respiración artificial con las debidas precauciones. Si continua el problema de respiración proporcione oxígeno. Si hay contacto por **vía ocular** enjuague con abundante agua por lo menos durante 15 minutos a chorro directo. Si la irritación persiste asista con un médico. Si hay contacto por **vía dermal**, quite la ropa contaminada. Lavar la piel con agua corriente y jabón cambie de ropa al paciente y manténgalo en reposo y abrigado. Si la irritación persiste asista con un médico. Si existió contacto por **vía oral**, no induzca el vómito. Si la persona está consciente lave la boca con agua. No administre leche o sustancias que contenga grasa, administre carbón activado suspendido a dosis de un gramo por kilogramo de peso. Si la persona esta inconsciente no le haga vomitar ni administre nada por la boca.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO"

GRUPO QUIMICO de **IMIDACLOPRID** es **NEONICOTINOIDES** y **ALFACIPERMETRINA** es **PIRETROIDES**
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No existe antídoto específico, por lo que en caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático. Si el material fue ingerido realizar el lavado gástrico.

SIGNOS Y SINTOMAS DE INTOXICACION: Por **vía oral** puede causar malestar estomacal, temblores, náuseas, mareos, aumento de la salivación, sequedad en la boca y vómito. Por **vía dermal** puede causar salpullido o irritación en la piel. Por **vía inhalatoria** puede causar irritación en nariz, estornudos, garganta irritada, tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho. Por **vía ocular** puede causar ardor o picazón en los ojos así como ojos llorosos.



COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
 CONTRA RIESGOS SANITARIOS
 COMISION DE ATENCION Y REGULARIZACION
 ETIQUETA AUTORIZADA
 REF. EXP. NO. 193906 11B004
 30/05/2019

GABRIELA MORENO GARCIA
 SUBDIRECCION EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
 NUTRIENTES VEGETALES

"MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS."

"MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAÑO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION.

"CATEGORIA ECOTOXICOLOGICA"

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMIFEROS Y AVES)."

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)."

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS.NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUNTRAN LIBANDO."

ETIQUETA AUTORIZADA
REF EXP. NO. 193300611B0004
30/05/2019

GABRIELA MORENO GARCIA
SUBDIRECCION EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES



(Parte derecha)

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

Imidacloprid 105 g/L + Alfacipermetrina 32 g/L / RESIFUM ALFA / RESIFUM PLUS / RESIFUM MAX / RESIFUM ULTRA / RESIFUM DUO / CIRANO ALFA / CIRANO ALFA PLUS / RESIFUM ALFA FLOW / RESIFUM PLUS FLOW / RESIFUM MAX FLOW / CIRANO ALFA FLOW / CIRANO ALFA PLUS FLOW / CIRANO FLOW RESIFUM PLUS SC / RESIFUM MAX SC / RESIFUM ULTRA SC / RESIFUM DUO SC / CIRANO ALFA SC / CIRANO PLUS / CIRANO DUO / CIRANO PLUS SC / CIRANO DUO SC (Imidacloprid al 9.93 % p/p, equivalente a 105 g de i.a./L + Alfacipermetrina al 3.03 % p/p, equivalente a 32 g de i.a./L) es una mezcla de dos insecticidas, uno de la familia de los neonicotinoides (Imidacloprid) y el segundo de la familia de los piretroides (Alfacipermetrina). El producto se recomienda para el control de una amplia gama de artrópodos voladores y rastrojeros como arañas, alacranes, cucarachas, moscas, chinches, ácaros, hormigas entre otros. Este producto se recomienda en aplicación urbana en las siguientes plagas:

PLAGA	DOSIS	METODO DE APLICACIÓN
ARAÑAS		
Viuda Negra (<i>Latrodectus mactans</i>)	10 mL/L de agua	Para el control de viuda negra realizar las aplicaciones en rincones y zonas oscuras y de poco tránsito de construcciones y casa habitación. Para el control de araña café o violinista aplicar detrás de cuadros, closet, roperos, cabecera de cama, cortinas y persianas.
Araña café o Violinista (<i>Loxosceles reclusa</i>)		
ALACRANES		
Alacran (<i>Centruroides spp.</i>) (<i>Vaejovis spp.</i>)	10 mL/L de agua	Alacranes realizar aplicaciones perimetrales a dosis alta en construcciones y casa habitación. Se recomienda tener especial cuidado en hendiduras, orificios, huecos y montículos de piedras.
CUCARACHAS		
Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>)	5 a 10 mL/L de agua	Asperjar en la cocina estantería, despenseros y muebles en general teniendo especial atención en huecos y hendiduras evitar lugares donde pueda ser lavado o eliminado el producto no combine el producto con cebo en gel para evitar la contaminación del mismo. Para control de cucaracha americana, asperjar de manera perimetral en casa habitación en los alrededores y en coladeras
Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)		
Cucaracha Oriental (<i>Blatta Orientalis</i>)		
MOSCAS		
Mosca Domestica (<i>Mosca domestica</i>)	5 a 10 mL/L de agua	Para el control de moscas en casa habitación, se debe asperjar en las paredes en el área de vuelo de la mosca entre 0.70 m y 1.80 m de altura, de igual forma realizar aplicaciones en las zonas de reposo de la mosca. En industria alimentaria se debe aplicar alrededor de accesos, puertas y ventanas, en depósitos de basura y en áreas permitidas por normas aplicables.
Mosca de los establos (<i>Stomoxys calcitrans</i>)		
Mosca domestica menor (<i>Fannia canicularis</i>)		
Falsa mosca de los establos (<i>Muscina stabulans</i>)		
Mosca negra (<i>Ophyra spp.</i>)		
Mosca de la carne o Moscardon (<i>Phaenicia spp.</i>)		
CHINCHES Y GARRAPATAS		
Chinche de cama (<i>Cimex spp.</i>)	5 a 10 mL/L de agua	Para el control de chinches es necesario sacar camas (bases) y colchones al aire libre, realizar aspersiones directas sobre las bases y dejar 24 a 48 horas al aire libre antes de volver a utilizar
Acaros (<i>Rhipicephalus sanguineus</i>) (<i>Amblyomma americanum</i>) (<i>Ixodes scapularis</i>) (<i>Dermacentor variabilis</i>) (<i>Boophilus microplus</i>)		
HORMIGAS		
Homiga cabezona (<i>Pheidole megacephala</i>)	5 a 10 mL/L de agua	Para hormigas realizar aspersiones directamente en los orificios de salida de las hormigas, realizando aplicaciones periódicas para eliminar los hormigueros. De igual manera se recomienda hacer aspersiones perimetrales en casa habitación y otras construcciones.
Homiga de fuego (<i>Solenopsis invicta</i>)		
Homiga de segadora (<i>Pogonomyrmex spp.</i>)		
Homiga arriera (<i>Atta spp.</i>) (<i>Acromyrmex spp.</i>)		



COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS
COMISION DE AUTORIZACION
ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 193300611B0004
30/05/2019

GABRIELA MORENO GARCIA
SUBDIRECCION EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES

Cada litro de mezcla cubre aproximadamente de 25 a 30 m² dependiendo de la rugosidad y/o porosidad de la superficie

"METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO"

Al preparar y aplicar el producto, se debe de utilizar el equipo de protección personal indicado en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO. Imidacloprid 105 g/L + Alfacipermetrina 32 g/L / RESIFUM ALFA / RESIFUM PLUS / RESIFUM MAX / RESIFUM ULTRA / RESIFUM DUO / CIRANO ALFA / CIRANO ALFA PLUS / RESIFUM ALFA FLOW / RESIFUM PLUS FLOW / RESIFUM MAX FLOW / CIRANO ALFA FLOW / CIRANO ALFA PLUS FLOW / CIRANO FLOW RESIFUM PLUS SC / RESIFUM MAX SC / RESIFUM ULTRA SC / RESIFUM DUO SC / CIRANO ALFA SC / CIRANO PLUS / CIRANO DUO / CIRANO PLUS SC / CIRANO DUO SC (Imidacloprid al 9.93 % p/p, equivalente a 105 g de i.a./L + Alfacipermetrina al 3.03 % p/p, equivalente a 32 g de i.a./L) se diluye a razón de 5 a 10 mL/L de agua, se recomienda poner la mitad de agua a utilizar en el tanque aspersor y poner la cantidad total del producto para posteriormente completar con agua la cantidad calculada y finalmente hacer una ligera agitación para tener una mezcla homogénea en el tanque y en la aplicación.

Antes de aplicar se debe limpiar el área de zonas de acceso de las plagas. Aplicar en las superficies y grietas de tal manera que queden bien cubiertas hasta que casi escurra la solución. Si existen problemas de re-invasión, habrá que aplicar tratamientos repetidos. No aplicar directamente a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se preparan.

Imidacloprid 105 g/L + Alfacipermetrina 32 g/L / RESIFUM ALFA / RESIFUM PLUS / RESIFUM MAX / RESIFUM ULTRA / RESIFUM DUO / CIRANO ALFA / CIRANO ALFA PLUS / RESIFUM ALFA FLOW / RESIFUM PLUS FLOW / RESIFUM MAX FLOW / CIRANO ALFA FLOW / CIRANO ALFA PLUS FLOW / CIRANO FLOW RESIFUM PLUS SC / RESIFUM MAX SC / RESIFUM ULTRA SC / RESIFUM DUO SC / CIRANO ALFA SC / CIRANO PLUS / CIRANO DUO / CIRANO PLUS SC / CIRANO DUO SC (Imidacloprid al 9.93 % p/p, equivalente a 105 g de i.a./L + Alfacipermetrina al 3.03 % p/p, equivalente a 32 g de i.a./L) se aplica con aspersor manual o motorizado, puede ser usado en interiores y exteriores tales como: Instalaciones de industria alimentaria, industria hotelera y restaurantera, casa habitación, oficinas y bodegas en general, hospitales y escuelas así como edificios y construcciones en general, vehículos de transporte como camiones y autobuses, aviones, trenes, barcos y aplicaciones en el exterior:

Realizar las aspersiones en los lugares donde habitan las plagas, para ello deberá retirar a cualquier animal doméstico mientras realiza la aplicación de 2 a 4 horas. Después de la aplicación se podrá reubicar a dichas mascotas, sin ningún problema, el tipo de aplicación puede ser en banda perimetral o aplicación general en cocinas, baños, recamaras, sala y comedores teniendo especial atención el tipo de plaga que se trate por ejemplo el hábitat de la cucaracha alemana son las cocinas, el hábitat de las cucarachas americanas son los drenajes y registros. Se recomienda hacer aplicaciones asperjando directamente en el hormiguero o bien puede inyectar el producto alrededor de los pozos o nidos de hormigas a una profundidad de 30 a 80 centímetros. Para el control de arañas y alacranes usar la dosis alta y hacer aplicaciones en banda perimetral en los lugares que deseamos proteger teniendo especial atención en hendiduras y grietas así como lugares oscuros o rincones.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la re infestación lo justifique un periodo de 30 días.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 30 días entre aplicación y aplicación, tomando atención del grado de infestación de la plaga a controlar

TIEMPO DE REENTRADA: Para mayor seguridad del personal y de las personas que vivan o laboren en las áreas tratadas, se deberá esperar un periodo de 2 a 4 horas.

CONTRAINDICACIONES: No perforo o incinere el envase. No trate estructuras que contengan agua como cisternas, pozos pequeños y profundos con posible contaminación de agua.



COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
CONTRA ENFERMEDADES Y PLAGAS
SECRETARIA DE SALUD
COMISION ETIQUETA AUTORIZADA
REF. EXP. NO. 1939006118004
30/05/2019

GABRIELA MORENO GARCIA
SUBDIRECCION EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES

INCOMPATIBILIDAD: El producto Imidacloprid 105 g/L + Alfacipermetrina 32 g/L / RESIFUM ALFA / RESIFUM PLUS / RESIFUM MAX / RESIFUM ULTRA / RESIFUM DUO / CIRANO ALFA / CIRANO ALFA PLUS / RESIFUM ALFA FLOW / RESIFUM PLUS FLOW / RESIFUM MAX FLOW / CIRANO ALFA FLOW / CIRANO ALFA PLUS FLOW / CIRANO FLOW RESIFUM PLUS SC / RESIFUM MAX SC / RESIFUM ULTRA SC / RESIFUM DUO SC / CIRANO ALFA SC / CIRANO PLUS / CIRANO DUO / CIRANO PLUS SC / CIRANO DUO SC (Imidacloprid al 9.93 % p/p, equivalente a 105 g de i.a./L + Alfacipermetrina al 3.03 % p/p, equivalente a 32 g de i.a./L, Suspensión Concentrada), no debe mezclarse con otros productos de uso urbano.

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
SECRETARIA DE SALUD
COMUNIDAD MEXICANA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
SECRETARIA DE SALUD
COMUNIDAD MEXICANA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
SECRETARIA DE SALUD
COMUNIDAD MEXICANA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GABRIELA MORENO GARCIA
SUBDIRECCION EJECUTIVA DE PLAGUICIDAS Y
NUTRIENTES VEGETALES

