

# IMINEX SC

Control en industria avícola · *Alphitobius diaperinus*



**IMINEX** está especialmente formulado para la industria avícola, para el control del escarabajo de la cama (*Alphitobius diaperinus*) tanto en sus formas adultas como larvarias, siendo efectivo en una sola dosis.

**IMINEX** es un insecticida a base del ingrediente activo Imidacloprid, el cual pertenece al grupo químico de los neonicotinoides, caracterizado por presentar baja toxicidad en mamíferos.

**IMINEX** no presenta resistencia cruzada con insecticidas del grupo de los piretroides, órganos fosforados o carbamatos, por lo que se recomienda en programas de rotación de insecticida.

**IMINEX** no posee solventes orgánicos, lo que lo convierte en una formulación de bajo olor y poco irritante, disminuyendo los tiempos de reingreso a las zonas tratadas, junto a esto, la formulación de **IMINEX** es altamente estable, con una elevada residualidad en superficies absorbentes.



## ► MODO DE ACCIÓN

**Donde aplicar:** Alrededor de los pabellones de engorda, crianza y postura. Se debe aplicar por aspersión en pisos, zócalos, cielos, paredes y bajo comederos.

**Concentrar la aplicación donde los escarabajos se congregan:** sobre la cama, debajo de las líneas de los comederos, a lo largo del perímetro de la nave y en la parte inferior de las paredes. Hacer especial hincapié en las zonas de cría.

**Cuando aplicar:** aplicar entre la salida e ingreso de aves siguiendo los procedimientos de sanitización. Tiempo de reentrada a zonas tratadas: evite el reingreso de personas y animales post-aplicación hasta que el área tratada esté seca y limpia. Se recomiendan 30 minutos de ventilación.

## ► DOSIS

Tipo de Aplicación	Dosis	Lugares
Aspersión manual o a motor	80 - 100 cc. en 5 lt. de agua/ 100 m <sup>2</sup>	Alrededor de los pabellones de engorda, crianza, y postura. Asperjar en pisos, zócalos, cielos, paredes y donde se concentra el escarabajo de la cama: sobre la cama, bajo los comederos, en la parte inferior de las paredes, etc.

IMINEX 44 SC	
COMPOSICIÓN	Imidacloprid 44% SC
FORMATOS	Envases de 1 L
REGISTRO USO URBANO	RSCO-INAC-0199-0688-064-36.67
CLASE TOXICOLOGICA	4 PRECAUCION