

## FICHA TECNICA

### APLICACIÓN URBANA **Sorex<sup>®</sup> Pellets**

Difenacoum  
Rodenticida / Pellets / Cumarinas

#### “COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

| INGREDIENTE ACTIVO   | % EN PESO |
|--|-----------|
| <b>Difenacoum:</b> 3-[3-(1,1'-Bifenil)-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil]<br>-4-hidroxi-2h-1-benzopiran-2-ona.....<br>(Equivalente 0.05 gr.de i.a./kg ) | 0.005 %   |
| <b>INGREDIENTES INERTES:</b> .....   | 99.995 %  |
| Total.....   | 100.00 %  |

REG.RSCO-URB-RODE-515-305-057-0.005

**REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MEXICO POR:**

**BASF MEXICANA S.A. DE C.V.**

AV. INSURGENTES SUR 975,  
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,  
C.P. 03710 MÉXICO, D.F.  
TEL: 01 (55) 5325-2600

**HECHO EN INGLATERRA**

## INSTRUCCIONES DE USO

**Sorex<sup>®</sup> Pellets** es un rodenticida anticoagulante, activo contra todas las especies de roedores urbanos como son *Rattus norvegicus*, *R. Rattus* y *Mus musculus* que causan daño en áreas urbanas, domésticas, jardines, áreas industriales, plantas procesadoras de alimentos, restaurantes, hospitales y oficinas. Es activo contra especies de roedores que presentan resistencia a otros anticoagulantes.

### **Método para preparar y aplicar el producto.**

- Limpiar el área infectada lo mejor posible.
- Retirar todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
- Mantener los bloques protegidos de la humedad y la intemperie.
- Revisar semanalmente los puntos de cebado y rellenarlos cuando sea necesario.
- Reemplazar completamente todo cebo que se haya contaminado o dañado (moho).
- Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo.
- Conforme aparezca los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los alimentos y de las fuentes de agua.
- Mantenga algunos puntos de cebado permanentes para evitar reinfestaciones.

**Sorex<sup>®</sup> Pellets** no causa recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar.

- Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, dependiendo del estado físico y edad del roedor.
- Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario.
- El número y tamaño de los puntos de cebo a usar dependerá de la severidad de la infestación.
- Se recomienda el uso de **Sorex<sup>®</sup> Pellets** en áreas de exteriores.
- Se recomienda el uso de **Sorex<sup>®</sup> Pellets** en áreas exteriores.
- Proteger de la humedad.

### PARA USO EN AREAS INTERIORES

| <b>Plaga</b> | <b>Infestación alta</b>       | <b>Infestación baja</b>         |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rata         | 160 gr. de cebo cada 5 metros | 80 gr. de cebo cada 5-10 metros |
| Ratón        | 30 gr. de cebo cada 2 metros  | 15 gr. de cebo cada 3.5 metros  |

Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras. Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta nuevos objetos y lugares, por lo que es recomendable mover los cebaderos ocasionalmente. Se debe evitar el acceso de animales domésticos.