

# FICHA TÉCNICA



<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>10.09.2013</b>	<b>Fecha de actualización:</b>	<b>29.08.2016</b>
<b>Elaboró</b>	<b>MEDSI</b>	<b>Revisó</b>	<b>EOXOM</b>
<b>Identificación de la empresa:</b>	<b>Bayer de México S.A. de C.V.</b> División Bayer Environmental Science Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No. 259 Col. Ampliación Granada C.P. 11520 México, D.F.		
<b>Teléfonos de emergencia:</b>	Bayer de México: (55) 5728 3000 ext. 7011 Seguridad Industrial, Planta Santa Clara: (55) 5699 14 82 SINTOX: (55) 5598 6659 Lada sin costo: 01 800 009 2800		
<b>FICAM®W</b>			
<b>"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"</b>	<b>% en peso</b>		
<b>Ingrediente activo:</b>			
<b>Bendiocarb:</b> 2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-il metilcarbamato (Equivalente a 800 g de i.a./Kg)	80.00		
<b>Ingredientes inertes:</b>			
Humectante, dispersante, vehículo	<u>20.00</u>		
TOTAL	100.00		
<b>RSCO-URB-INAC-166-309-002-80</b>			
Titular del registro: Bayer de México, S.A. de C.V. Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540 Tel.: 01 (55) 5728 3000  "HECHO EN ESPAÑA" ® Marca Registrada por Bayer      RFC: BME820511SU5		Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V. Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada. C.P. 11520, México, D.F. Lada sin costo 01-800-229-37-27 <a href="mailto:servicioalcliente.crop@bayer.com">servicioalcliente.crop@bayer.com</a> <a href="http://www.saludambiental.com.mx">www.saludambiental.com.mx</a>	
<b>"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"</b>			
<b>"PRIMEROS AUXILIOS"</b>			
Manténgase al paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de contacto con los ojos enjuagarlos con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel lavar profusamente el área contaminada con agua y jabón. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente.			
<b>"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"</b>			
Insecticida carbamato. <b>Signos y síntomas de intoxicación:</b> <b>Contacto con la piel:</b> causa irritación de la piel; <b>por contacto con los ojos</b> causa irritación de los ojos y <b>por inhalación</b> causa irritación de las membranas mucosas. Los signos y síntomas por intoxicación cefalea, visión borrosa, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, sudoración profusa, salivación, disnea, espasmos musculares y ataxia. <b>Tratamiento:</b> se recomienda el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Adminístrese tratamiento sintomático y sulfato de atropina como antídoto, por vía endovenosa o intramuscular hasta lograr la atropinización del paciente. El diazepam puede ser útil para controlar las convulsiones. <b>Antídoto:</b> sulfato de atropina.			
<b>URGENCIAS</b>			
En caso de intoxicación llamar al SINTOX (24 horas, 365 días del año). Teléfonos 01 (55) 5598-6659 y 01 (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 01800 0092800.			
<b>"GARANTIA"</b>			
Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Bayer de su localidad.			
<b>"INSTRUCCIONES DE USO"</b>			
<b>"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"</b>			
Ficam ® W es un insecticida carbamato con buen efecto inicial y residual, que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos y arácnidos plaga indicados. Aplíquese con cualquier aspersor convencional. Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio y en buen estado.			

PLAGAS		Dosis
Nombre común	Nombre científico	

# FICHA TÉCNICA



MOSCAS MOSQUITOS CUCARACHAS HORMIGAS CHINCHES PULGAS GRILLOS ARAÑAS ALACRANES	<i>Musca domestica, Fannia spp., Stomoxys calcitrans</i> <i>Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.</i> <i>Blatella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana</i> <i>Lasius niger, Solenopsis spp., Monomorium pharaonis</i> <i>Cimex lectularius</i> <i>Pulex irritans, Ctenocephalides canis, C. felis</i> <i>Acheta domesticus</i> <i>Latrodectus mactans, Lycosa spp.</i> <i>Centruroides spp., Vejovis spp.</i>	Diluir 12 g de Ficam® W en 5 L de agua
Dosis especial para el control de plagas en situaciones extremas como: infestaciones altas y condiciones poco higiénicas o donde se requiera un largo periodo de control (de hasta de 60 días), así como para superficies altamente porosas y absorbentes como adobe, bajareque, palma o bardas de piedra.		
CUCARACHAS HORMIGAS CHINCHES PULGAS GRILLOS ARAÑAS ALACRANES	<i>Blatella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana</i> <i>Lasius niger, Solenopsis spp., Monomorium pharaonis</i> <i>Cimex lectularius</i> <i>Pulex irritans, Ctenocephalides canis, C. felis</i> <i>Acheta domesticus</i> <i>Latrodectus mactans, Lycosa spp.</i> <i>Centruroides spp., Vejovis spp.</i>	Diluir 24 g de Ficam® W en 5 L de agua

Rendimiento: la mezcla preparada rinde para 100 m<sup>2</sup> de superficie en banda o directamente en grietas y rendijas.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y MÉTODO DE APLICACIÓN

Determine la superficie del área a tratar para calcular la cantidad de mezcla a preparar. Ficam® W se puede aplicar con cualquier aspersor convencional.

Llenar la mitad del tanque de aspersión con agua. Iniciar la agitación y agregar la dosis indicada de Ficam® W al tanque. Continuar con la agitación y adicionar la cantidad restante de agua para lograr la concentración deseada. Mantener la mezcla en constante agitación para asegurar una aplicación uniforme. Antes de cada tratamiento, se deberá preparar nuevamente la mezcla.

Ficam® W debe mezclarse con agua según la dosis señalada, agitándose bien hasta lograr una suspensión homogénea. Ficam® W deberá aplicarse en lugares frecuentados por los insectos, en sus refugios y áreas por las que transitan.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** el intervalo de aplicación depende del grado de infestación, se recomienda una aplicación cada 30 a 60 días.

**TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS:** se deberá esperar 30 minutos posteriores tras la aplicación.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar en contra del viento.