

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (lentes impermeables, guantes de PVC, gales, mascarilla contra polvo o mascarilla completa con cartucho respiratorio). Mantenga el producto bien tapado en su empaque original. No use el producto en ambientes de agua.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE MANIPULANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

INHALACIÓN: Lleve al paciente a un lugar ventilado, manteniéndolo en reposo.
INGESTIÓN: Induzca al vómito. Consultar un doctor o comunicarse con un centro de atención para envenenamientos lo antes posible.
CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos con suficiente agua limpia.
 No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.
 En caso de ingestión accidental por mascotas provóquese inmediatamente el vómito. Lleve inmediatamente con el médico veterinario y muéstrele esta etiqueta.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

En caso de exposición a esta sustancia se puede presentar descoordinación, adormecimiento, pérdida de apetito y pesadilla.

Grupo químico del producto: Difenilaminas.

Antídoto y Tratamiento específico: Fastrac Pellets no es un rodenticida anticoagulante, induce al vómito y realizar lavado gástrico. Si el paciente presenta convulsiones suministrar anticonvulsivos como el diphenhydramin. En caso de edema cerebral suministrar diuréticos (furosemida) y corticosteroides (dexametasona).

Signos y síntomas de intoxicación: Adormecimiento, descoordinación, dolor de cabeza y confusión moderada. En casos agudos se puede presentar tambor general, convulsiones y dificultad al respirar.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMAGNAT"

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCANO"

"APLICACIÓN URBANA"

Brometalina
 Rodenticida / Pellets
 Grupo Químico: Difenilaminas
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO
 Brometalina: N-metil-2,4 -dinitro-N-(2,4,6-tribromofenil)-6-(trifluorometil) benzamida
 (Ecuivalente a 0.1 g de i.a. / kg) 0.01%
INGREDIENTES INERTES:
 Asesantes, colorantes, portador y agente preventivo para la ingestión humana. 99.99%
 Total: 100.00%

No. de Registro: RSCD-URB-PDDE-517-309-057-0-010

CONTENIDO NETO: 1 kg



**NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN
 NO CIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL**

Importado y distribuido por:
SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.
 Amsterdam No. 143 • Col. Hipódromo Condasa
 06100 México, D.F.
 Tel: (55) 5271 2560 / 5515 8890
 www.univarsaismo.com "Hecho En E.U.A."

Formulado Por:
Bell
 3650 Kineman Blvd.
 Madison, WI 53704 U.S.A.
 www.belllabs.com

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

PRECAUCIÓN**"INSTRUCCIONES DE USO"**

Útilice FASTRAC PELLETS para el control de roedores como rata común o de alcantarilla (Rattus norvegicus, Rattus cañal) y ratón doméstico (Mus musculus) de la siguiente forma:

PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	GRAMOS POR PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
RATAS	LIGERA A MODERADA	25 a 60	Colóquese el producto indicado punto de cebado o directo en la madriguera a cada 5 a 10 m.
RATA DE ALCANTARILLA RATA NEGRA	SEVERA	60 a 100	
EN MADRIGUERAS DE RATAS			Coloque de 30 a 60 gramos de FASTRAC PELLETS dentro de cada madriguera.
RATONES Ratón doméstico	LIGERA A SEVERA	5 a 15	Colóquese la cantidad de producto indicada por punto de cebado directo en la madriguera o cada 2 a 4 m.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Inmediato.

Métodos para preparar y aplicar el producto

Coloque FASTRAC PELLETS donde observe señales de la presencia de roedores (tales como excrementos, manchas grasosas de la presencia de roedores, huellas) así como la proximidad de sus madrigueras y caminos. Aplique este producto directamente en las entradas de cada madriguera y en sitios frecuentados por los roedores.

Mantenga constante la cantidad de FASTRAC PELLETS hasta que cesen las señales de presencia de roedores. Manténgase la dotación ininterrumpida de ceba fresco durante 10 a 15 días hasta que desaparezcan los signos de actividad de las ratas y ratones. Posteriormente repítase el tratamiento a intervalos semanales hasta que desista el consumo de ceba o se detecte la disminución de daños causados por los roedores. Para prevenir la reinfestación establezca sistemas de mantenimiento. Si ocurre una reinfestación repita el tratamiento. Cuando ya no haya actividad de roedores recupere los restos de ceba y deséchelos, junto los roedores muertos y quémelos.

Frecuencia de aplicación: Repetir la aplicación en caso de reinfestación.

CONTRAINDICACIONES

FASTRAC PELLETS es un ceba de aplicación directa. Manéjese los cebos con guantes. No se deben mezclar con insecticidas o ningún otro producto, para evitar el rechazo del ceba por los roedores. Evite manipular el producto con el fin de impedir que éste sea rechazado por los roedores.

"GARANTÍA"

SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con éste producto se obtengan.

021214/01-14

Product Code: 65910

Lot: No:

Fecha De Fabricación:

Fecha De Caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

