

Q Foska 10-4-7

USO: Fertilizante foliar para etapas de desarrollo.

DESCRIPCIÓN: QFoska Foliar 10-4-7 es un fertilizante foliar complejo que contiene los nutrientes en proporciones adecuadas y balanceadas, con base en los requerimientos de los cultivos de alto rendimiento como ornamentales, flores de corte, hortalizas en sistema de producción intensiva en campo y en invernaderos.

QFoska Foliar 10-4-7 contiene micro nutrientes quelatados que son rápidamente asimilados y transportados en el interior de la planta.



COMPOSICIÓN:

Nitrógeno nítrico	2.00 %
Nitrógeno amoniacal	0.80 %
Nitrógeno orgánico	7.20 %
Nitrógeno total	10.00 %
Fósforo asimilable P ₂ O ₅	4.00 %
Fósforo total	4.00 %
Potasio K ₂ O	7.00 %
Magnesio (Mg)	0.02 %
Hierro (Fe)	100 ppm
Zinc (Zn)	30 ppm
Cobre (Cu)	20 ppm
Boro (B)	15 ppm
Manganeso (Mn)	10 ppm
Cobalto (Co)	2 ppm

DOSIS: El uso de QFoska Foliar 10-4-7 no sustituye la fertilización del suelo sino que la complementa ya que aporta nutrientes cuando y donde la planta lo necesita.

Cultivo	Dosis litros/ha	Numero de aplicaciones	Inicio de Fertilización
Cucurbitáceas Melón, pepino, Sandía calabaza y calabacita	2-3	3-5	30 días después de la emergencia, aplique cada 15 días.

Solanáceas Chile, tomate, jitomate, papa, berenjena, y tabaco	3-6	2-3	10 días después de trasplante o 30 días después de la emergencia, aplique cada 15 días.
Liliáceas Cebolla, ajo y poro	4-5	1 cada 10 -14 días	30 días después del trasplante o 60 días después de la emergencia aplique cada 15 días.
Crucíferas Coliflor, repollo, brócoli, col de Bruselas, col de china y rábano	3-5	4-6	30 días después del trasplante o 60 días después de la emergencia, aplique cada 15 días.
Umbelíferas Apio y zanahoria	3-5 3-4	4-6 3-5	30 días después de trasplante. Después del desarrollo de suficiente mesa foliar aplique cada 15 días.
Leguminosas Frijol, chícharo, cacahuete, soya haba, lenteja, garbanzo y alfalfa	3-4	2-3	15 días después de la emergencia hasta la floración. Aplique cada 15 días. Después continuar con QFoska foliar 5-15-5 (ver etiqueta de dicho producto)
Gramíneas Trigo, cebada, sorgo y maíz	3-6	2	Al momento del amacollamiento y después del espigamiento, aplique cada 15 días.
Frutales	3-5	4-6	Hasta 30 días antes de floración, aplique cada 15 días.
Algodonero	3-6	4-6	30 días después de la floración en intervalos de 15 días.

FORMULADO EN MÉXICO POR:



Química Foliar s.a. de c.v.

Av. Urbina No. 4, Fraccionamiento Parque Industrial

Naucaipan, Edo. De México C. P. 53489

Tel. 53-00-35-71 Fax 53-01-08-63

ventas@qfoliar.com.mx www.qfoliar.com.mx