

ACTELIC® 50CE / ACTELIC® VECTORES



Syngenta Agro, S.A. de C.V. / Home Care, Lawn & Garden
San Lorenzo 1009 Piso 1º, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F.
Atención general al cliente: sergio.gonzalez@syngenta.com; teresa.ambriz@syngenta.com;
alejandra.espinosa@syngenta.com; leonardo.sobrino@syngenta.com
01 800 711 7857 • 01 55 9183 9174 • servicios.clientes@syngenta.com;
www.syngenta.com.mx ver: Productos Profesionales

Utilice el equipo de protección indicado para cada técnica de aplicación. Este producto contiene solventes. Síntomas de intoxicación por uso inadecuado del producto: síntomas muscarínicos o nicotínicos. Antídoto: Sulfato de atropina y tratamiento de sostén. En caso de intoxicación consulte al médico. Emergencias SIN-TOX/ PROCCYT: Servicio las 24 horas de los 365 días del año. Área Metropolitana: 01 (55) 55 98 66 59 y 01 (55) 56 11 26 34; LADA Sin Costo 01 800 009 28 00.

Medidas precautorias: no se mezcle este producto en la misma bomba con otros plaguicidas. Evite el uso de agua sucia y con pH alcalino con los plaguicidas. Realice el triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y confínelos para su disposición final de acuerdo a la normatividad vigente.

Presentación: caja con 12 x 1 litro.



Actellic® Vectores

Insecticida

CLASIFICACIÓN	REGISTRO
<ul style="list-style-type: none">• Insecticida y/o Acaricida • Organofosforado• Heterocíclico, enlace P=S• Pirimifós Metil • Concentrado Emulsionable (CE)	RSCO-URB-INAC-158-301-009-49

Amplio espectro adulticida y larvicida, aliado en la rotación de plaguicidas para el manejo de la resistencia en el control de vectores y plagas urbanas. Especificación OMS (WHO). Incluido en Roll Back Malaria/OMS.

Composición porcentual	Porcentaje en peso
Ingrediente activo Pirimifós metil: 0-2-Dietilamino-6-metilpirimidin-4-il 0,0-dimetil-fosforotioato (Equivalente a 500 g de i.a./ L a 20°C). Nominal:	49.0%
Ingredientes inertes Surfactantes y solvente. Nominal:	51.0%
Total	100.0%

Syngenta Agro, S.A. de C.V. / Home Care, Lawn & Garden
San Lorenzo 1009 Piso 1º, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F.
Atención general al cliente: sergio.gonzalez@syngenta.com; teresa.ambriz@syngenta.com;
alejandra.espinosa@syngenta.com; leonardo.sobрино@syngenta.com
01 800 711 7857 • 01 55 9183 9174 • servicios.clientes@syngenta.com;
www.syngenta.com.mx ver: Productos Profesionales



Información general:

Actellic® Vectores, formulado con Pirimifós metil en concentrado emulsionable, es un organofosforado de Syngenta, plaguicida adulticida y larvicida, alternativa de rotación para el control de plagas resistentes a piretroides y otros grupos químicos, autorizado para el control de vectores de importancia en Salud Pública como los artrópodos transmisores de Dengue, Paludismo (Malaria), Enfermedad del Oeste del Nilo y otras encefalitis y para el control de insectos voladores, rastreros y arácnidos, clasificados como plagas urbanas y molestia sanitaria. Uso larvicida para mosquitos y moscas (dípteros), aplicado directamente al agua y lodos, ya que es biodegradable. Registro para uso urbano.

Este producto es comercializado mundialmente y tiene especificación de la Organización Mundial de la Salud (WHOPES) para su uso en Salud Pública y ha sido evaluado en México por investigadores autorizados por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) para el proceso de inclusión en la lista de insecticidas autorizados del CENAPRECE para el control de vectores para técnicas de aplicación residual, nebulización con Ultra Bajo Volumen y como larvicida. Incluido en el portafolio de productos Roll Back Malaria / OMS.

Actellic® Vectores actúa en el sistema nervioso de las plagas, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, por lo que el Pirimifós metil de **Actellic® Vectores** es una herramienta para la rotación entre grupos químicos considerada por International Resistance Action Committee (IRAC) para el Manejo de la Resistencia a Insecticidas (Insecticide Resistance Management ó IRM). Elimina plagas las plagas por contacto directo, ingestión y por gasificación, ya que la presión de vapor característica del ingrediente activo le confiere esta ventaja sobre otros grupos químicos y sin el riesgo de los fumigantes como la fosfina.

Actellic® Vectores es flexible, muy rentable y versátil, compatible con diferentes equipos y técnicas de aplicación. Consulte la etiqueta y al área técnica de Syngenta.

Instrucciones de uso: consulte la etiqueta del producto.

APLICACIÓN RESIDUAL, rociado intradomiciliar: dosis 10 a 20 ml para 1L de mezcla con agua, cobertura 25 m² (dependiendo de la calibración, tipo de boquilla, gasto de boquilla del equipo y velocidad de aplicación). Aspersión manual, bomba motorizada, inyección a grietas y hendiduras: equipo micro inyectores o aditamento de popote para boquilla de aspersor manual.

APLICACIÓN LARVICIDA: aplicar de manera focalizada en cuerpos de agua. Dosis: Cuerpos de agua profundos 10 ml de **Actellic® Vectores** para 1 L de mezcla en agua, 1L de mezcla para 100 m² ó 100 L de mezcla / ha.

NEBULIZACIÓN: aplicación no residual en interiores y exteriores (coadyuvante en el control de plagas combinado con aplicación residual).

- Ultra Bajo Volumen (ULV), Bajo Volumen (BV): 200 a 400 ml de **Actellic® Vectores** en 1 a 2 litros de mezcla con diesel / ha, sin diluir 0.5 L de **Actellic® Vectores** /ha.
- Termonebulización: 40 a 200 ml / ha dilución en diésel.

ACTELIC® VECTORES / DEMAND® 2.5CS



Syngenta Agro, S.A. de C.V. / Home Care, Lawn & Garden
San Lorenzo 1009 Piso 1º, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F.
Atención general al cliente: sergio.gonzalez@syngenta.com; teresa.ambriz@syngenta.com;
alejandra.espinosa@syngenta.com; leonardo.sobrino@syngenta.com
01 800 711 7857 • 01 55 9183 9174 • servicios.clientes@syngenta.com;
www.syngenta.com.mx ver: Productos Profesionales

Tiempo de reentrada al sitio tratado:

Inmediatamente que seca la aplicación residual o se ventila el área nebulizada. Se recomienda esperar 30 minutos.

Categoría Toxicológica: 3 BANDA AMARILLA (NOM-232-SSA1-2009); sin embargo, aunque el activo se encuentra en muy alta concentración en la formulación, tiene amplio margen de seguridad toxicológica y es biodegradable.

Precauciones y advertencias de uso:

Utilice el equipo de protección indicado para cada técnica de aplicación. Este producto contiene solventes.

Síntomas de intoxicación por uso inadecuado del producto:

Síntomas muscarínicos o nicotínicos. Antídoto: Sulfato de atropina y tratamiento de sostén. En caso de intoxicación consulte al médico. Emergencias: SINTOX/ PROCYT: Servicio las 24 horas de los 365 días del año. Área Metropolitana: 01 (55) 55 98 66 59 y 01 (55) 56 11 26 34; LADA Sin Costo 01 800 009 28 00.

Medidas precautorias: no se mezcle este producto en la misma bomba con otros plaguicidas. Evite el uso de agua sucia y con pH alcalino con los plaguicidas. Realice el triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y confínelos para su disposición final de acuerdo a la normatividad vigente.

Presentación: caja con 12 x 1 litro.



CLASIFICACIÓN	REGISTRO
<ul style="list-style-type: none">• Insecticida y/o Acaricida • Piretroide Tipo II• Lambda Cyhalotrina • Suspensión microencapsulada	RSCO-URB-INAC-177-04-15-2.5

El mayor poder residual contra insectos, arañas y alacranes.