

FICHA TÉCNICA CAPTANE 50 PH



NOMBRE COMERCIAL: CAPTANE 50 PH

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Carboxamida

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Captan: N-triclorometiltio-4-ciclohexeno-1,2-dicarboximida **50.00%**

(Equivalente a 500 g de I.A./Kg)

Agente humectante, dispersante y portadores, no mas de **50.00%**

REG: RSCO-FUNG-0306-342-002-050

TIPO DE FORMULACIÓN: Fungicida/Polvo humectable

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Polvo; punto de fusión 178 °C; densidad relativa a 1.74 g/mL; solubilidad en agua 5.1 mg/L a 25 °C.

MODO DE ACCIÓN: Actúa sobre el patógeno interfiriendo diferentes reacciones químicas durante la respiración del hongo, haciendo virtualmente imposible para el hongo la resistencia del producto, es un inhibidor multisitio del proceso respiratorio del hongo.

USOS AUTORIZADOS: Sobre los cultivos de jitomate para combatir enfermedades provocadas por hongos.

FICHA TÉCNICA CAPTANE 50 PH



ENFERMEDADES, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

CULTIVO	Enfermedad (Nombre científico)	Nombre común	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES
Jitomate (SL)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)		3.0	Aplicar CAPTAN 50 PH en forma preventiva o con niveles muy bajos de infestación. Aplicar semanalmente

Nota: SL = Sin Límite

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior de la bolsa, realizar esta operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: En una cubeta con agua vierta el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme.

Agregue ésta lentamente y sin dejar de agitar al tanque de aplicación, que contenga agua hasta la mitad. Sin dejar de agitar, agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando de obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora, deberá agitar antes la mezcla.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en horas de calor intenso, ni con vientos mayores a 15 Km/h, aplique siempre a favor del viento.

Materias alcalinas como cal, azufre y caldo de bordelés, pueden reducir la acción fungicida de CAPTANE 50 PH.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla contra polvo y vapores tóxicos, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.