

FICHA TÉCNICA CIALOTRIN 5CE



NOMBRE COMERCIAL: DINASTIA MAX

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	
LAMBDA CIHALOTRINA	
(R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.....	5.60%
(Equivalente a 50g de i.a./L)	
INGREDIENTES INERTES:	
Emulsificante y solvente.....	94.40%

FAMILIA O GRUPO QUIMICO:

El ingrediente activo de **CIALOTRIN 5CE** pertenece al grupo químico de los **Piretroides**

REGISTRO SANITARIO COFPRIS: RSCO-INAC-0177-X0088-009-5.60

TIPO DE FORMULACION:

CIALOTRIN 5CE es un Insecticida formulado como Concentrado Emulsionable

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO:

Densidad: 0.98g/mL; pH: 6-8

MODO DE ACCION DE CIALOTRIN 5CE:

CIALOTRIN 5CE es un insecticida no sistémico que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos por contacto e ingestión con acción de contacto, estomacal y residual. Además cuenta con buenas propiedades repelentes. Tiene un rápido derribe y prolongada acción residual.

USOS AUTORIZADOS DE CIALOTRIN 5CE:

CIALOTRIN 5CE está autorizado para su aplicación foliar en el cultivo de Maíz.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA CIALOTRIN 5CE



CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

CIALOTRIN 5CE es un insecticida que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos por contacto e ingestión, presenta además un buen efecto residual, provoca hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente mueren. Produce el bloqueo de la conducción de los estímulos nerviosos principalmente por modificar la permeabilidad de las membranas de las células nerviosas a los de iones sodio. Es recomendable en el cultivo y contra la plaga aquí indicada:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Maíz (5)	Gusano cogolero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.3 - 0.5 L/ha	Inicie las aplicaciones en cobertura total al follaje, cuando se observen las primeras infestaciones de larvas en los primeros instares.

() **INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS: 12 horas después de la última aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR DINASTIA MAX:

Abra el envase de CIALOTRIN 5CE girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar

CONTRAINDICACIONES:

CIALOTRIN 5CE deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA CIALOTRIN 5CE



presencia de lluvia en las 4 horas posteriores a la aplicación, ni cuando haya vientos mayores a los 15 km/h, realice las aplicaciones a favor del viento.

CIALOTRIN 5CE no es fitotóxico al cultivo aquí recomendado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

CIALOTRIN 5CE no se recomienda en mezcla de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Use el equipo de protección personal (EPP) limpio y completo: mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>