

FICHA TÉCNICA METALKIL



NOMBRE COMERCIAL: METALKIL

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Mezcla: Anilina + Aromático policlorado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): **Metalaxyl:** N-(2, 6-Dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-DL-alanina-metil ester **9.00 %**

(Equivalente a 90 g de I.A./Kg)

Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo **72.00 %**

(Equivalente a 720 g de I.A./Kg)

Portador y dispersante, no más de **19.00 %**

REG: RSCO-MEZC-1311-305-002-081

TIPO DE FORMULACIÓN: Fungicida/Polvo humectable

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Información no disponible.

MODO DE ACCIÓN: Tiene acción en varios sitios de la célula fungosa, altera o interrumpe numerosos procesos bioquímicos de naturaleza enzimática indispensables, para la respiración y transporte de energía en las células. Actúa interrumpiendo el ciclo de Krebs y la formación de ATP. Detiene el desarrollo del micelio de los hongos, así como la esporulación del patógeno en la planta. Inactiva los grupos sulfidrilos.

USOS AUTORIZADOS: Para su aplicación al follaje en los cultivos de jitomate y papa.



ENFERMEDADES, DOSIS Y OBSERVACIONES:

CULTIVO	PLAGA (Nombre científico)	Nombre común	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES
Jitomate (7) Papa (7)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)		2.0 – 3.0	Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de las enfermedades. Para el caso de pudrición del tubérculo, se recomienda una aplicación durante la floración y otros 7 días después. No hacer más de 3 aplicaciones por temporada. Bajo condiciones severas de presión de la enfermedad intercalar aplicaciones de productos de contacto cada 7 días.

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior de la bolsa, realizar esta operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: En una cubeta con agua vierta el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme.


Agregue ésta lentamente y sin dejar de agitar al tanque de aplicación, que contenga agua hasta la mitad. Sin dejar de agitar, agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando de obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora, deberá agitar antes la mezcla.

FICHA TÉCNICA METALKIL



CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea fuerte (más de 15 Km/hr).

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.



Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: <http://www.tridente.com.mx>