

240 mm

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar gorra y overol de algodón, guantes de polinitrilo, botas de neopreno, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, usar lentes de seguridad.
- Evitar desmayos del producto, en su caso utilizar aserrín para su absorción.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- NO DESTAPE LAS BOLSILLAS CON LA BOCA
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- Retire a la persona de la zona contaminada para evitar mayor contacto y recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, cambíale la ropa, manténela abrigada y en reposo.
- En caso de ingestión, si está consciente y no ha vomitado, provocar el vómito introduciendo un dedo por la garganta o administrando agua tibia salada.
- En caso de salpicadura en la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con agua y jabón.
- En caso de salpicadura en los ojos, lavar con abundante agua limpia por menos de 15 minutos.
- Si la persona está inconsciente, verificar que respira sin dificultad, no provocar el vómito y no introducir nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

- Grupo químico de GUSPER TRIDENTE: Piretroides
- Síntomas y efectos: Leves: dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica. Agudos: contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, calambres y sensación de asfía
- Tratamiento: No hay antídoto específico, por lo que el tratamiento médico debe ser sintomático. Puede administrarse vía IV fenobarbital o medicamentos del grupo de los anticonvulsivantes. La atención debe ser dirigida a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

"MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMÁS RECogerlo EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

"USO EXCLUSIVO DE JARDINERÍA"



Permetrina

Insecticida y/o acaricida/polvo/piretroides

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Ingrediente activo
Permetrina: 3-Fenoxibenzil (IRS)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato No menos de: 2.00
(Equivalente a 20g de I.A./Kg)
Diluyente No más de: 98.00
Registro: RSCO- JAR-INAC-156-329-001-02 TOTAL 100.00

Contenido neto: 1 kg

PRECAUCIÓN

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL.
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA
FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.

Heriberto Frias 1529-703, Colonia del Valle, CP 03100, México D.F.
 Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
 Fax: (55) 9183-2420, Ladao: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx
 http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda su uso en las siguientes plagas:

Nombre común	Nombre científico
Araña roja	<i>Tetranychus spp</i>
Araña café	<i>Bryobiapraeitiosa</i>
Chicharrita	<i>Empoasca spp</i>
Pulgón mizus	<i>Myzus persicae</i>
Trips	<i>Thrips spp</i>
Hormiga	<i>Atta spp</i>
Falso medidor	<i>Pseudopplusia includens</i>
Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>
Gusano peludo	<i>Estigmene acrea</i>

DOSIS: No hay una dosis específica, dado que es un polvo, solo se aplica la cantidad necesaria para contrarrestar las plagas antes mencionadas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicación de 2 a 3 meses.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA: En áreas abiertas se puede entrar después de 1 día; en áreas cerradas 2 días de ventilación, después de 1 día de exposición

MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO: Con el equipo de protección puesto, abrir la bolsa con unas tijeras en forma diagonal solo una de las esquinas, manteniendo en forma vertical, para evitar que se tire el producto al suelo. El producto **GUSPER®**, es un polvo seco, aplicar siempre con el equipo de protección sugerido; aplicar en forma de espolvoreo sobre las áreas infectadas, siempre esparciendo de manera uniforme y de manera estratégica, es decir, en las áreas donde transiten, aniden o se reproduzcan las plagas.

CONTRAINDICACIONES: No hay alguna indicación al respecto, dado su uso en jardinería.

153

13



PRECAUCIÓN

