



La difacinona pertenece a un grupo de sustancias químicas llamadas anticoagulantes indandiona, que evitan que la sangre se coagule. Es uno de un grupo de varios rodenticidas anticoagulantes de primera generación (FGARs), que incluye warfarina y clorofacinona. Los FGARs se desarrollaron antes de los raticidas anticoagulantes de segunda generación (SGARs). La difacinona ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los ingredientes activos más efectivos y rentables para el control de roedores. Ha sido formulado en bloques, tortas y polvo de rastreo (uso restringido), lo que le da una variedad de usos para cualquier ocasión.

CLASIFICACIÓN	ACTIVA	REGISTRO
Rodenticida / Bloque parafinado	DIFACINONA	RSCO-RODE-0503-304-033-0.005

\*\*Antídoto: Administrar vitamina K,

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	PORCENTAJE EN PESO	
INGREDIENTE ACTIVO: DIFACINONA: (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg.)		0.005%
INGREDIENTES INERTES: Cereales grado alimenticio, azúcar, aceite grado alimenticio, parafina, colorante azul		99.995%
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS	TOTAL:	100.00%

### INSTRUCCIONES DE USO

RODENT CAKE® útilícese para el control de roedores como la rata común o de alcantarillas (Rattus rattus) y el ratón doméstico (Mus musculus) de la siguiente forma:

PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	# DE BLOQUES / Punto de Cebado	OBSERVACIONES	
Ratas Alcantarillas	LIGERA A MODERADA	1-3	Colóquese el producto indicado por punto de cebado o directo en la madriguera a cada 7 a 10 m.	
(Rattus rattus)	SEVERA	16		
RATONES Ratón doméstico (Mus musculus)		500 ml	Colóquese 1 bloque por punto cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia.	

## CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum)

GRADO DE Infestación	CEBO REQUERIDO: KG/HA	NO. DE BLOQUES/ Punto de Cebado	OBSERVACIONES
8 - 15%	2kg	1 a 2 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación y ubíquese donde el roedor busca en forma natural su alimento, protegiendo los bloques del paso de maquinaria e implementos agrícolas, personas y animales no objeto de control. Preferentemente
Mayor 15%	3kg	2 a 3 bloques	en el sitio más distante del surco para proteger los cebos de las inundaciones cada 5 a 10 metros de distancia o directo a la madriguera. Colóquese o aplique el cebo al inicio de cada ciclo o posterior al riego por los menos 2 veces al año.

MAÍZ (Zea Maiz) SORGO (Sorguhm vilgare) TRIGO (Tritucum spp) AVENA (Avena sativa) ARROZ (Oryza sativa)

GRADO DE Infestación	CEBO REQUERIDO: KG/HA	# DE BLOQUES / Punto de Cebado	OBSERVACIONES
LIGERA	1 a 2 kg	1 a 2 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación cada 5 a 10 metros de distancia
MODERADA	2 a 3 kg	2 a 3 bloques	o directo en la madriguera. Colóquese el cebo al inicio de la fase vegetativa.
SEVERA	Mínimo 3kg	Mínimo 3kg	TRIGO, AVENA Y ARROZ Aplíquese la cantidad de cebo requerida de la misma forma que en el cultivo del maíz. Colóquese el cebo al inicio de la fase vegetativa o macollo (arroz).

# RODENT CAKE®

JITOMATE (Lycopersicum esculentum) PEPINO (Cucumis sativus) LECHUGA (Lactuca sativa) SANDIA (Cucurbita citrulus) MELÓN (Cucumis melo) CALABAZA (Cucurbita pepo)

GRADO DE Infestación	CEBO REQUERIDO: KG/HA	# DE BLOQUES / Punto de Cebado	OBSERVACIONES
LIGERA	1 kg	1 a 2 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación cada 5 a 10 metros de distancia
MODERADA	2 kg	o directo en la r 2 a 3 bloques Cológuese el ce	o directo en la madriguera. Colóquese el cebo 4 ó 5 semanas antes de la fecha de cosecha. El uso de cebaderos o de tubos facilita el
SEVERA	Mínimo 3kg	Mínimo 3kg	control del cebo y permite a los roedores continuar el consumo.

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO DE ORDEN
Rodent Cake®, 28g Blox	Cubeta 8 kg	65230
Rodent Cake®, 10g Blox	Cubeta 8 kg	923010
Rodent Cake® Domestico, 28g Blox	Cubeta 8 kg	4260









### BENEFICIOS CLAVE DE LOS CEBOS DE RODENT CAKE

- Contiene difacinone, anticoagulante de primera generación de alimentación múltiple, para un excelente control de ratas y ratones
  - Alta calidad del cebo y eficacia para infestaciones retadoras y difíciles de controlar.
  - Formulado con ingredientes (materias primas) de grado alimenticio para una excelente eficiencia y control de roedores.

  - Control efectivo en interiores y exteriores; un cebo versátil para todo uso.
    La probabilidad de aversión por el cebo se minimiza porque la mortalidad ocurre varios días después de que se
  - Tiene a la vitamina K1 como antídoto.
  - RODENT CAKE es un cebo extruido para ratas y ratones que logra un excelente control en interiores y exteriores. Un cebo de mantenimiento excelente, RODENT CAKE se fabrica a partir del proceso de extrusión único de Bell Labs que produce un cebo duro de bordes afilados.
  - RODENT CAKE está diseñado para condiciones de alta humedad porque resiste el moho y la rancidez. RODENT CAKE controla ratas noruegas, ratas de techo y ratones domésticos, dentro y alrededor de hogares, granjas y edificios industriales. .

#### Importado y distribuido por:

SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. Villa Primavera No. 640 Int. 3 Col. Villas de Lindavista, C.P. 64540 Monterrey, Nuevo León. R.F.C. SEC 910827 4P0 Tels: (55) 5271 2990 / 5515 8893 www.pestweb.com.mx | contacto@pestweb.com.mx Formulado Por:

BELL LABORATORIES, INC. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704 USA www.belllabs.com

RODENT CAKE® son marcas de Bell Laboratories, Inc. Estados Unidos.

