"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado, gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. Mezcle los preparativos con un removedor (nunca con las manos) aunque se tengan los guantes puestos. Con el equipo de protección puesto, llene el tanque del equipo de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Para evitar un accidente durante la aplicación, sepárese a una distancia adecuada de su compañero. No aplique en contra del viento. No use la boca para succionar sifones para transvasar plaguicidas, ni sople boquillas de aspersión obturadas. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente y una solución alcalina como lejía. Guarde los plaguicidas en un lugar fresco, seco y seguro bajo llave. Mantenga su equipo de protección limpio, lavándolo con agua y jabón abundante, poniendo atención al envés de guantes y mascarillas. Cambie con frecuencia los filtros del respirador. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁRESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: Si el producto fue inhalado: Retire a la persona de la zona contaminada, manténgala caliente y en descanso, si su respiración es difícil, dé oxígeno, si no respira, dé respiración artificial y consiga atención médica inmediata. Si el tuvo contacto en ojos: Lávese con abundante agua limpia al menos durante 15 min. y consiga atención médica especializada. Si hubo contacto en la piel: Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada y lavar la piel con abundante agua y jabón, seguida de un enjuague con agua caliente. Si el producto fue ingerido: NO INDUZCA AL VÓMITO, enjuague la boca con buches de agua y realice un lavado gástrico por personal calificado. Nunca administre nada a una persona inconsciente. Si la persona está INCONSCIENTE no le provoque el vómito, no trate de introducirla nada en la boca; acueste al paciente cuidando que la boca y la nariz estén libres de obstáculos y colóquelo en un lugar fresco y bien ventilado, lejos del área de contaminación.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico.- Organofosforado.
- Signos y Síntomas de Intoxicación:
- **Leves** : Dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, mareo, náuseas, vómitos, calambres, opresión torácica.
- En estado grave: Contracción de la pupila, salivación, sudoración, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, pérdida de conciencia, convulsiones, edema pulmonar, pérdida de control de esfínteres, asfixia por paro respiratorio.
- Tratamiento Antídoto, Sulfato de Atropina.
- En intoxicación leve: En adultos, aplicar una ampolleta (1.0 mg) en forma intramuscular o subcutánea cada 2-3 horas según respuesta. En el caso de niños 0.05 mg de sulfato de atropina/kg de peso cada 2 a 3 horas según respuesta.
- En caso de intoxicación de moderada a severa: Para adultos una ampolleta (1.0 mg) en forma intramuscular cada 10 – 15 minutos según respuesta, hasta secar mucosas orales. En niños 0.05 mg/kg de peso en forma intramuscular o subcutánea cada 10 – 15 minutos según respuesta, hasta secar mucosas orales.
- Antídoto toxogonin: Este antídoto se aplica en el caso de intoxicaciones severas en donde la aplicación del sulfato de atropina no es suficiente. Aplicar en forma intravenosa toxogonin 6 – 8 mg / kg de peso, diluido en 250 ml de solución fisiológica y pasarlo en 30 – 60 minutos cada dos a tres horas por cuatro dosis. En niños el médico deberá valorar su equilibrio hídrico y diluir de acuerdo a su peso corporal. Están contraindicados el uso de morfina, epinefrina. No administrar sulfato de atropina a una persona cianótica.
- En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 009280; 01(55) 5598 6659 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASE VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A.de C.V. GARANTIZA EL CONTENIDO EXACTO INDICADO EN LA COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA ETIQUETA, PERO NO OTORGA GARANTÍA ALGUNA ACERCA DEL MAL USO Y MANEJO DE ESTE PRODUCTO NI POR LOS DAÑOS QUE EL MISMO PUDIERA OCASIONAR, YA QUE LA DOSIFICACIÓN, MANEJO, Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO SE REALIZAN FUERA DE NUESTRO CONTROL.

"USO AGRÍCOLA"

Carioca 48

CALIDAD TRIDENTE

clorpirifos etil

insecticida / concentrado emulsionable

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:	% (p/p)
INGREDIENTE ACTIVO	
Clorpirifos etil: 0.0-dietil-0-(3,5,6,-tricloro-2-piridinil-)	
fosforotioato, no menos de	**44.44**
(Equivalente a 480 g.de i.a./l a 20°C)	
Solventes, Emusificante y compuestos relacionados, no mas de	**55.56**
Total	**100.00**

Registro: RSCO-INAC-0115-306-009-044

Contenido neto: 950 ml

PRECAUCIÓN

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después de su fabricación

TITULAR DEL REGISTRO:
KOOR INTERCOMERCIAL S.A.

DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100
México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400,
Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,
E-mail: tridente@prodigy.net.mx
www.tridente.com.mx

"HECHO EN ISRAEL, ENVASADO EN MÉXICO"

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CARIOCA 48, es recomendado en las siguientes dosis y forma de aplicación para el control de las plagas en los cultivos que a continuación se indican.

CULTIVO	PLAGAS	L/HA.
Algodonero (21)	Gusano bellotero (*Helicoverpa zea*) (*Heliothis virescens*) Gusano soldado (*Spodoptera exigua*)	1.0 – 2.0
Alfalfa * (21)	Gusano soldado (*Spodoptera exigua*) Picudo egipcio de la alfalfa (*Hypera brunneipennis*) Chinche ligus (*Lygus spp.*) Gusano trozador (*Agrotis malefida*) (*Peridroma spp.*) (*Euxoa spp.*)	0.75 1.0 0.5 – 1.0 1.0 – 1.5 1.5 – 1.75
Chile Jitomate (7)	Gusano soldado (*Spodoptera exigua.*)	1.0 –1.5
Maíz (21)	Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) Gusano soldado (*Mythimna unipuncta*)	0.5 – 0.75 0.75 – 1.5
Manzano (30)	Pulgón lanígero del manzano (*Eriosoma lanigerum*)	1 – 2 cc/l lt. de agua
Pepino (7)	Minador serpentina del chile (*Liriomyza munda*)	1.5 – 2.0
Sorgo (21)	Mosquita midge (*Contarinia sorghicola*) Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) Gusano del fruto (*Helicoverpa zea.*)	0.5
Frijol Ejotero (20)	Gusano soldado (*Spodoptera exigua*) Minador de la hoja (*Liriomyza spp.*)	1.0 – 1.75 1.0 – 1.75
Soya (21)	Gusano soldado (*Spodoptera exigua*) Gusano peludo (*Estigmene acrea*)	1.0 – 1.5 1.25 – 1.5
Arroz (21)	Gusano soldado (*Spodoptera exigua*)	0.75 – 1.25

( ) Intervalo entre la última aplicación y la cosecha. SL= SIN LIMITE
Tiempo de reentrada: 48 hrs después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Forma de abrir el envase: Antes de abrir el envase, utilice equipo de protección personal adecuado y con cuidado desenrosque la tapa, hasta romper el sello exterior, posteriormente despegue el sello de seguridad interno, evitando inhalar el producto.
Llene el tanque de aplicación a la mitad de su capacidad con agua, agregue las dosis aquí recomendadas del producto, efectuando un triple lavado del envase vacío, vertiendo el agua del lavado al tanque y llenar hasta su capacidad con agua, manteniendo en constante agitación, para asegurar una mezcla uniforme y una buena cobertura del follaje. Prepare sólo la cantidad de solución necesaria para la aplicación.

CONTRAINDICACIONES: (*) No aplique dentro de los 21 días que anteceden al corte de la alfalfa. No se aplique el producto sin el uso del equipo de protección adecuado.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas bajo las anteriores instrucciones de uso.

INCOMPATIBILIDAD: Para mayor seguridad se recomienda hacer pruebas previas en campo cuando se desee mezclar con otros productos. Se recomienda que para las mezclas se utilicen productos que cuenten con registro vigente y estén autorizados por la Autoridad competente en los cultivos que aquí se indican.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL