

FICHA TÉCNICA FUMINO 56



NOMBRE COMERCIAL: FUMINO 56

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Fosforo inorgánico

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Fosforo de aluminio: Fosforo de Aluminio **56.00 %**

(Equivalente a 560g de I.A./Kg)

Diluyente bloqueador de la inflamación y protector de la humedad, no más de **44.00 %**

REG:RSCO-FUMI-0407-316-006-056

TIPO DE FORMULACIÓN: Fumigante/Pastillas

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Pastillas solidas; Reacciona con la humedad desprendiendo fosfina (H_3P) y $Al(OH)_3$; Punto de fusión 1350 °C

MODO DE ACCIÓN: La fosfina se une a endotelios vasculares produciendo radicales libres con peroxidación lipídica de membranas celulares. Aumenta la entrada de calcio intracelular inhibiendo la enzima citocromooxidasa con lo que se altera la respiración celular.

USOS AUTORIZADOS: Para tratamiento de granos y semillas almacenados. Medios de transporte y espacios vacíos.

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA FUMINO 56



PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

Tipo de Tratamiento	Dosis (Tabletas o pastillas)	Tiempo de exposición	Tiempo de reentrada	Método de aplicación
Granos almacenados en sitios o a granel	3 a 6/ ton	Dependiendo de la hermeticidad pero no menos de 72 horas	6 horas mínimo	<ul style="list-style-type: none"> a) Agregar las tabletas o pastillas a mano a intervalos regulares durante el proceso de llenado b) En el caso de que el grano esté almacenado introducir las tabletas o pastillas a éste mediante una sonda. Hermetizar c) En el caso de sitios usar de ser posible un distribuidor automático
<p>Estibas de grano ensacado.</p> <p>Tabaco en fardos, cajas y barriles</p>	<p>2 a 3/ m³</p> <p>1/m³</p>	<p>72 horas</p> <p>96 horas</p>	<p>6 horas mínimo</p> <p>Fardos mínimo 48 horas, los demás 72 horas.</p>	Colocar las tabletas o pastillas de FUMINO 56% separadas unas de otras sobre cartones a modo de bandejas alrededor o debajo de las estibas, dejando espacio amplio entre éstos y la lona con el fin de facilitar la generación del gas asegurando una perfecta hermeticidad entre los bordes de lona y el suelo.

FICHA TÉCNICA FUMINO 56



Fumigación de espacios y locales vacíos previo almacenaje	1 a 3/m ³	Mínimo 72 horas	6 horas mínimo	Para la fumigación de espacios vacíos o molinos, hermetizar lo mejor posible y colocar las tabletas o pastillas separadas unas de otras sobre catones a modo de bandejas y distribuirlos de acuerdo con el volumen y las condiciones del local.
---	----------------------	-----------------	----------------	---

CONTRAINDICACIONES: No fumigar cuando la temperatura sea menor a 5°C. No usar en presencia de agua o riesgo de contacto con el agua.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que contengan agua.