"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar mascarilla contra polvo y vapores tóxicos, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación
- Lavar con detergente y una solución alcalina como lejía, la ropa y el equipo utilizado para el trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- Retirar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto; recostarla boca abajo en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo.
- Si hubo contacto con la piel o los ojos, lavar la parte afectada con agua corriente durante 15 minutos
- Si se ha ingerido el producto y la persona está consciente, sentar para evitar que se sofoque.
- Si la persona esta inconsciente, asegurar de que pueda respirar sin dificultad, no provocar el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico de MALATION 500 TRIDENTE, Organofosforado
- Síntomas y efectos: Dolor de cabeza, mareos, amblíopia, debilidad, nauseas, calambres, diarrea, molestias del pecho y contracción de la pupila. Ocurre una disminución de la colinesterasa hemática.
- Tratamiento: No hay tratamiento específico, por lo que se debe de tratar al paciente de manera sintomática, el tratamiento debe estar dirigido a mantener la frecuencia respiratoria y cardiaca de manera optima.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES
- ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

ATOX

Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

PURA

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

"USO AGRÍCOLA"

Malation 500

CALIDAD TRIDENTE

malatión

insecticida y/o acaricida / concentrado emulsionable

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:	**% (p/p)**
Malatión: 0,0-dimetil fosforoditioato de dietil mercaptosuccinato	**48.6**
(Equivalente a 500 g de I.A./L)	
Disolventes, emulsificantes, y compuestos relacionados, no mas de	**51.4**
Total	**100.00**

Registro: RSCO-INAC-0143-024-009-049

Contenido neto: 950 ml

PRECAUCIÓN

NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS LITROS/HA	PLAGA NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO)L/HA
Maíz (8)	1.0 - 2.0	Pulgón del cogollo (*Rhopalosiphum maidis*); Pulgón verde del follaje (*Rhopalosiphum maidis*)
	2.0	Chicharrita (*Dalbulus elimatus*); Chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*); Frailecillo (*Macrodactylus sp*)
Sorgo (7)	1.0 - 2.0	Gusano telañero (Nola sorghiella); Mosquita midge (Contarinia sorghicola); Pulgón verde del follaje (*Schizephis graminum*)
Berenjena (8)	1.0 - 3.0	Pulga saltona negra (*Epitrix sp*)
Melón (1)	1.0 - 2.0	Pulgón del algodón y del melón (*Aphis gossypii*); Diabrotica (*Diabrotica sp*); Barrenador del
Pepino (1)		pepino (*Diaphania nitidalis*); Barrenador del fruto (*Diaphania hyalinata*)
Chile (3)	1.0 - 2.0	Chicharrita del betabel (*Empoasca spp*); Pulga saltona negra (*Epitrix sp*); Barrenillo del chile (*Anthonomus eugenii*)
Frijol (1)	1.0 - 3.0	Conchuela del frijol (*Epilachna varivestis*); Picudo del ejote (*Apion godmani*); Chicharrita (*Empoasca sp*); Trips (*Callothrips spp*)
Trigo (7)	1.0 - 2.0	Pulgón del cogollo (*Rhopalosiphum maidis*); Pulgón verde del follaje (*Schizaphis graminum*)
Cebolla (3)	2.0 - 3.0	Trips de la cebolla (*Thrips tabaci*)
Arroz (7)	2.0	Chinche del arroz (*Oebalus insularis*); Gusano soldado (*Spodoptera exigua*); Falsa chicharrita (*Sogata sp*)
Calabaza (1)	1.0 - 2.0	Pulga saltona negra (*Epitrix sp*)
Aguacatero (7)	250 ml/100 L de agua	Chinche de encaje (*Acysta perseae*); Periquito del aguacatero (*Metcalffiella monogramma*);
Durazno (7)		Chinche de encaje del durazno (*Corythucha moelfreshi*); Escama de San José (*Quadraspidiotus perniciosus*); Frailecillo (*Macrodactylus sp*)
Mango (2)		Papalota del mango (*Hansenia pulberulenta*); Escama del mango (*Coccus mangiferae*)
Papayo (SL)		Mosca de la papaya (*Toxotrypana curvicauda*); Piojo harinoso (*Planococcus spp*)
Lima (7)		Escama amarilla (*Aonidiella citrina*); Pulgón negro de los cítricos (*Toxoptera aurantii*); Piojo
Limonero (7)		harinoso de los cítricos (*Planococcus citri*); Piojo blanco de los cítricos (*Unaspis citri*); Escama negra del olivo (*Saissetia oleae*); Escama algodonosa (*Icerya purchasi*)
Naranjo (7)		Escama amarilla (*Aonidiella citrina*); Escama roja de California (*Aonidiella aurantii*); Escama suave o purpura (*Lepidosaphes beckii*); Mosca de la fruta (*Anastrepha ludens*); Piojo harinoso de los cítricos (*Planococcus citri*); Pulgón negro delos cítricos (*Toxoptera aurantii*); Pulgón del algodón y del melón (*Aphis gossypii*); Mosca de la fruta (*Anstrepha ludens*)

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicar a intervalos de 5 a 7 días hasta controlar la infestación.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar está operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO: MALATION 500 TRIDENTE® es un concentrado emulsionable, debe de diluirse con agua, exceptuando la aplicación directa. Utilizar las dosis recomendadas por el fabricante. Se puede aplicar por medio de aspersores manuales, motorizados o por avión. Para aplicaciones pequeñas, diluir de 200 a 300 ml de MALATION 500 TRIDENTE® en 100 litros de agua y bañar con esta solución el follaje de las plantas atacadas

CONTRAINDICACIONES: Aplicar cuando no hagan vientos fuertes

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de reacción alcalina

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL

15

PRECAUCIÓN

A8