

FICHA TÉCNICA SARGENTO 250 SC



NOMBRE COMERCIAL: SARGENTO 250 SC

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Fenilurea

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P):

• **Pencicuron:** 1-(4-clorobencil)-1-ciclopentil-3-fenilurea **23.30 %**

(Equivalente a 250 g de I.A. / L a 20°C)

Humectante, dispersante, anticongelante, antiespumante, tinte rojo, agente espesante, bactericida, y vehículo **76.70 %**

REG: RSCO- FUNG-0354-0603-064-23.30

TIPO DE FORMULACIÓN: Fungicida / Suspensión Concentrada

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO:

Suspensión Concentrada

Densidad relativa 1.073 ± 0.03 g/mL (24°C)

MODO DE ACCIÓN:

Es un fungicida de contacto formulado como suspensión concentrada a base de pencicuron. Debido a su poca movilidad y a su adherencia en las plantas, tiene una prolongada protección contra la plaga.

USOS AUTORIZADOS:

Es un fungicida selectivo de uso agrícola, se recomienda su uso en el cultivo de papa.

ENFERMEDAD Y DOSIS:

Cultivo	Plaga	Dosis
Papa (1)	Costra Negra (<i>Rhizoctonia solani</i>)	10-12 L/ha

(1) Tiempo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México, Ciudad de México. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA SARGENTO 250 SC



TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: No entre al área tratada antes de 12 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Para abrir el envase utilice el equipo de protección personal adecuado (pantalón largo de algodón, gorra, overol de algodón, mascarilla, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Desenrosque la y quite con cuidado el sello protector. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

Calibre su equipo de aplicación para determinar el gasto de agua por hectárea a utilizar. Pueden usarse aguillones adaptados a un tractor, así como mochilas motorizadas o manuales.

Para preparar el producto, mida con una probeta o jarra medidora graduada la cantidad de **SARGENTO 250 SC** indicada en la etiqueta. Llene el tanque de aspersión con agua a la mitad y mantenga en agitación. Agregue la cantidad de producto previamente medida y luego agregue el resto de agua hasta llenar a su capacidad total, utilice agitación continua. Realizar una aspersión al fondo del surco al momento de la siembra. Dirija la pulverización para cubrir los tubérculos y la tierra del surco en contacto con ellos. Volumen recomendado: 300-350L de agua / ha.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer la aplicación en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta (mayor a 15 km/h).

INCOMPATIBILIDAD: **No se recomienda mezclar este producto con otros agroquímicos.**