

RODENTICIDA EN PELLETS  
"USO DOMESTICO"



Brodifacoum 0.005%

ANTICOAGULANTE



NOCIVO EN CASO DE INGESTION  
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

Contenido neto:  
Sobre con 20g

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

## ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Brodifacoum.....0.005%  
(Equivalente a 0.05g de i.a./Kg)  
Ingredientes Inertes: 99.995

**\*PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO\*** Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de DIFARAT® en pellets: guantes de neopreno, para evitar el contacto directo, evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel.

**\*PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO\*** ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA; "NO SE APLIQUEN EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS" "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, "EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS" "SIEMPRE USAR GUAANTES AL MANIPULAR EL PRODUCTO"

**\*CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE\*** Almacenar DIFARAT® en pellets en su envase original etiquetado, con la llave alejado de los niños, ancianos y mujeres embarazadas o en lactancia. "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES"

**\*PRIMEROS AUXILIOS\*** Las vías principales de riesgo es por ingestión accidental y por el contacto prolongado con la piel. Si el producto es ingerido en grandes cantidades este tiene una acción anticoagulante lo que se traduce en hemorragias, por lo que en caso de ingestión accidental del producto, NO provocar el vómito, acudir inmediatamente con el médico junto con este sobre y mantener a la persona afectada abrigada y en reposo y mantener a la persona alejada del área. Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.

Si el producto cayo en piel, lavar con agua y jabón por 15 minutos. En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua.

**\*MEDIDAS DE SOSTEN\***: Pueden ser necesarias transfusiones de sangre compatible si ocurren hemorragias severas o persistentes. "EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA"

### INSTRUCCIONES DE USO:

- 1.-Limpie el área infestada y retire todo alimento alternativo que sirva a los roedores.
- 2.-Coloque los cebos alejados de la humedad, protegidos de la intemperie, y en sitios inaccesibles a los niños y animales domésticos.
- 3.-Repita las aplicaciones del producto hasta que cesen las señales de actividad.

El producto deberá colocarse a lo largo de los lugares que frecuentan los roedores. Coloque el producto en cebaderos: 1 a 2 sobres a intervalos de 5 a 10 metros en el caso de ratas, un sobre a intervalos de 2 a 5 metros en el caso de los ratones.

Utilice el total del contenido del sobre.

No guarde sobrantes.



Atención a INTOXICACIONES  
01 800 000 ATOX (2869)



### GARANTIA DEL FABRICANTE:

FERRETERIA RIPOLL HERMANOS, S.A. DE C.V. garantiza la calidad y cantidad de este producto, pero no se hace responsable de los resultados derivados del uso y/o manejo del producto, ya que estas operaciones se realizan fuera de su control.

Registro Sanitario de Plaguicidas No.  
RSCO-DOM-RODE-0501-311-057-0.005

### Hecho en Corea del Sur

Importado y Envasado en México por:  
FERRETERIA RIPOLL HERMANOS, S.A. DE C. V.  
Av. Normalistas No. 1357. C.P. 44270  
Guadalajara, Jal., México. R.F.C. FRH860618-3D8

Distribuido por:  
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.  
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100  
México, CDMX, Tel. (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406,  
(55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,  
tridente@prodigy.net.mx | www.tridente.com.mx

No. de Lote  
Fecha de Caducidad

