


“APLICACIÓN URBANA”



“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**
- Usar guante y óculos de protección, guantes y botas de poliuretano, mascarilla contra polvo y vapores tóxicos, usar lentas de protección tipo químico.
 - Descontaminar el equipo de protección y el equipo de aplicación después de trabajar con ellos.
 - **PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**
 - NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
 - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES
 - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE EN EL ALMACÉN DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS
 - LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
 - NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
 - NO DESAPETE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
 - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
 - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES. USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
 - NO LAVE EL EQUIPO DE TRABAJO BARRERES Y FÓRMASE ROSA. LIMPIA
 - NO SE INGERA, NUNCA Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Retire a la persona de la zona contaminada para evitar mayor contacto y recostarlo en un lugar fresco y bien ventilado, cubriéndolo con una manta.
 - En caso de ingestión, si esta consciente y no ha vomitado, provocar el vómito introduciendo un dedo por la garganta o administrando agua tibia salada.
 - En caso de aplicación con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con agua y jabón.
 - En caso de aplicación sobre la piel o los ojos, lavar con abundante agua limpia por menos de 15 minutos.
 - Si la persona está inconsciente, verificar que respira sin dificultad, no provocar el vómito y no introducir nada en la boca.

- RECOMENDACIONES AL MEDICO**
- Grupo químico del RESIFUM TRIDENTE. No se puede establecer un solo grupo, dado a su composición de dos sustancias una del grupo de los piretroides (Cipermetrina) y la otra de los organofosforados (DDVP).
 - Síntomas y signos: dolor de cabeza, mareos, ataxia, debilidad, náuseas, calambres, diarrea, molestias de pecho y dificultad respiratoria.
 - Tratamiento: Administrar suero de atropina vía IV, de no ser posible, administrar vía IM de 0.4 mg a 2 mg, a intervalos de 15 a 30 minutos hasta conseguir la atropinización completa.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**
- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS
 - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME AL ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EN EL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS REGISTRADO ANTE LA SEMARAT.
 - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE FOSOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)
 - EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARGILLA). COLECTAR LOS DERRAMES EN UN CONTENEDOR Y ENTREGARLOS AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.
 - REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA**
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
 - ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PARA LAS ABEJAS
 - ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

Atención a Intoxicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE SE USAN LAS BOQUILLAS CORRECTAS Y EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADA. ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS



INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

RESIFUM U Es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas en el control de las plagas aquí indicadas.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS
Araña capulina	<i>Latreoleptes macleari</i>	5.0 – 10.0 ml en un litro de agua
Hormiga	<i>Solenopsis geminata</i> , <i>Atta spp</i>	
Cucaracha	<i>Periplaneta spp</i>	
Piño harinoso	<i>Pseudococcus spp</i>	
Cochinilla de humedad	<i>Trichoryctes spp</i>	
Alacrán	<i>Centruroides spp</i>	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones pueden repetirse en un periodo de hasta 7 días hasta que las plagas haya sido controlada.

TIEMPO DE RENTRADA A ZONA TRATADA: Se puede estar en el área tratada después de transcurridos 15 minutos después de ser ventilada

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desentrosar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior) retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO:

1. Añadir la mitad (1/2 litro) de agua limpia al depósito del aspersor o rociador.
2. Añadir la cantidad necesaria del producto en el depósito del aspersor.
3. Agregar agua hasta llenar el aspersor.
4. Cerrar el depósito del aspersor.
5. Agitar el aspersor para mezclar la emulsión.
6. Colocar el tanque a la presión recomendada por el fabricante.
7. Aplicar el insecticida de acuerdo a la tabla de recomendaciones indicadas anteriormente.
8. Antes de aplicar se debe limpiar el área de zonas de acceso de las plagas. Si existen plagas de reinvasión, habrá que aplicar tratamientos repetidos. No aplicar directamente a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen.

- COMPOSICIÓN**
- Cipermetrina: (±)-α-ciano-3-fenoxibencil (±)-cis, trans-3-(2, 2-diclorovinil)-2, ... 04.50
 2-dimetil ciclopropano carboxilato 20.00
 DDVP (diclorovos): 2,2-diclorovinil dimetil fosfato 75.50
 Solvente y emulsificantes, no mas de 100.00
Total 200.00
- Registro: RSCO-URB-MEZZ-1133-309-009-24.5
 Contenido neto: 1000 ml



TÓXICO SI SE INHALA

PELIGRO

Lote:
 Fecha de fabricación:
 Caducidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
 Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
 Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
 Teléfono comutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
 Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx, http://www.tridente.com.mx

“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

