



# FICHA TÉCNICA TYSON 4E

- **PLAGUICIDA:** Insecticida concentrado emulsionable, a base de CLORPIRIFOS ETIL, que pertenece al grupo de los Organofosforados
- **SINÓNIMOS:** O,O-dietil O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato; O,O-dietil O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) éster de ácido fosforotioico; Dursban; Brodan; Eradex; Lorsban; Pyrinex
- **COMPOSICIÓN PORCENTUAL:** Clorpirifos etil: 0,0-Dietil O-(3, 5, 6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato 45.21 % (Equivalente a 480 g de I.A./L); Solvente y emulsificantes, no más de 54.79 %.
- **REG:** RSCO-URB-INAC-115-377-009-45.21
- **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:** Líquido oleoso, color ámbar, olor característico a xilol y cloral;  $1.2 \times 10^{-2}$  mmHg a 20 °C; densidad relativa 1.100 g/MI; temperatura de inflamación 79.4 °C.
- **MODO DE ACCIÓN:** Insecticida de ingestión y de contacto, que al penetrar a las plagas, tanto rastreras como voladoras, actúa directamente sobre el sistema nervioso, causando una descoordinación muscular, de modo que las plagas pierden el control de sus movimientos, salen de sus madrigueras y mueren. La mezcla con dos sinergistas incrementan la efectividad (mayor mortalidad) y la rapidez (alto poder de derribo y desalojo) en el control de las plagas.
- **AUTORIZADO PARA SU USO:** Insecticida de uso urbano para el control de termitas.
- Para tratamiento en hoteles, restaurantes, supermercados, bodegas, sótanos, casas habitación, escuelas, oficinas y edificios en general.



# FICHA TÉCNICA TYSON 4E

## PLAGAS QUE CONTROLA:

| Nombre común        | Nombre científico               | Dosis de TYSON 2E   |                     |                           |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|                     |                                 | Pre construcción    | Post construcción   | Estructuras de madera     |
| Termita subterránea | <i>Reticulitermes lucifugus</i> | 1 L en 50 L de agua | 1 L en 50 L de agua | 100 – 150 ml / 4L de agua |

- **FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Para mayores efectos y un mejor control sobre la plaga, aplicar en intervalos de 7 días hasta obtener un control total.
- **EQUIPO DE PROTECCIÓN:** Usar gorra y overol de algodón, guantes y botas de poli nitrilo, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, usar lentes de protección tipo químico.

- Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx)